随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

| | 特异性 | 非特异性 |
|---|---|---|
| 投射起始核 | 接替核、联络核<br>（联络特工接替） | 髓板内核<br>（内啡肽） |
| 投射方式 | **点对点** | **弥散** |
| 投射范围 | 大脑皮层**特定**区域 | 大脑皮层**广泛**区域 |
| 意义 | **引起各种特定感觉**<br>**激发大脑皮层发出冲动**<br>就你给我站起来 | **维持和改变大脑皮层兴奋状态**<br>是特异性投射系统引起特定感觉的基础<br>（依靠**脑干网状结构上行唤醒**系统：被**巴比妥类**镇静催眠药阻断）巴比龙上网<br>多突触接替系统,易受药物影响而发生传导阻滞<br>直播让大家都打起精神 |

醒着脑电波活跃

①刺激 ttsx 猫的网状结构：猫从睡眠中唤醒，脑电图产生去同步化快波（醒着不同步）

②在中脑头端**切断网状结构**：猫进入持久**昏睡**状态，脑电图产生**同步化慢波**（睡觉同步）





图 10-34　切断特异和非特异传导通路后猫的行为与脑电图变化

A. 切断特异性传导通路而不损伤非特异性传导通路的猫，处于觉醒状态，A′ 为其脑电图；B. 切断非特异性传导通路的猫，处于昏睡状态，B′ 为其脑电图。

## 真题解析 • 其它感觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N18 A 传导慢痛的外周神经纤维是

A.Aγ 纤维

B.Aδ 纤维

C.B 类纤维

D.C 类纤维