核心精讲·突触传递、中枢抑制和易化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

联想神经接头

一、化学突触（通常指的突触）

（一）特点

单向	神经递质的释放只能从突触前膜→突触后膜 VS 神经纤维上AP双向传导
时间延搁	突触越多→反射所需时间越长 （记特殊：唯一单突触反射——腱反射，如膝跳反射简单）
兴奋节律改变	突触前、后神经元放电频率往往不同
总和	突触后电位属于局部电位
易疲劳	递质耗竭
对内环境变化敏感	突触间隙充填细胞外液、容易受药物影响
后发放与反馈	如环式联系




图 10-5　突触的基本类型模式图


a、b、c 分别表示轴突-树突式、轴突-胞体式和轴突-轴突式突触。

突触默认说化学突触

对比：电突触（细胞间的缝隙连接）

——快速、低电阻、双向

（如心肌细胞间的闰盘使其收缩呈全或无/功能合胞体）



（二）囊泡内的神经递质

小而清亮透明的囊泡	乙酰胆碱、氨基酸类递质如谷氨酸、GABA、甘氨酸（兴奋性神经递质 / 抑制性神经递质）
小而有致密中心的囊泡	儿茶酚胺类递质
大而有致密中心的囊泡	神经肽类递质 （大 mm 叫太太、小 mm 叫女儿。口诀仅记忆）