随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.影响突触后膜的受体


Ach　自身抗体　Ach（抢赢了）
N2-R　N2-R　N2-R
终板后膜

重症肌无力	自身抗体破坏 N_2-ACh-R→用新斯的明治疗 减少Ach水解
戈拉碘铵、十烃季铵、银环蛇毒、筒箭毒碱（拉失射箭）	阻断突触后膜 N_2-ACh-R

串：肌松药

ttsx	筒箭毒碱	琥珀胆碱
机制	竞争性肌松药 （阻断 N_2-R） 激动剂和阻断剂都会与受体结合 但筒箭毒碱与受体结合后无活性	非竞争性肌松药 ①激动 N_2-R→去极化→早期肌肉收缩 ②琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 N_2-R→终板膜持续去极化（去极化阻滞）→普通肌膜电压门控钠通道失活、受体脱敏
新斯的明解救	√ 筒箭毒碱占茅坑不拉屎、而 ACh 占茅坑拉屎，所以它们会抢茅坑	× 琥珀不新 不能让N2-R受体再被更多的Ach激动

小结：



小凯笔记自行整理

	定向突触传递	非定向突触传递
神经递质	有神经递质参与	有神经递质参与
结构基础	突触前膜、突触间隙、突触后膜	为曲张体，无突触前膜和突触后膜
常见部位	经典突触	单胺能（肾上腺素能、多巴胺能、5-羟色胺能）神经元的纤维末梢 自主神经节后纤维与效应细胞之间的接头
传递方向	单向传布	单向传布
传递速度	慢	慢
生理功能	根据不同的突触类型固定	使一个神经元支配许多效应器细胞