随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## 四、中枢易化

①突触后易化：突触后膜 EPSP 总和→EPSP↑

受体是GPCR

②突触前易化：B-A（**轴突-轴突**式突触）的 B 神经元释放 5-羟色胺→A 神经元 cAMP↑→钾通道磷酸化→钾通道关闭→动作电位复极化延缓→动作电位时程延长→进入 A 神经元的 $Ca^{2+}$↑→A 神经元的**兴奋性递质释放**↑→C 神经元的 **EPSP**↑

（**突触可塑性的敏感化**使某些生理功能变得容易发生）

突触后膜更容易达到阈电位/爆发动作电位,突触的传递就变强

### 真题解析·突触传递、中枢抑制和易化


习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N19 A 电突触传递的一般特点为
   A.单向，低电阻，快速
   B.单向，高电阻，慢速
   C.双向，低电阻，快速
   D.双向，高电阻，慢速

2. 2016N19 A 在突触传递中，与神经末梢释放递质的数量呈正相关的因素是
   A.活化区面积的大小
   B.末梢内囊泡的大小
   C.进入末梢的 $Ca^{2+}$量
   D.囊泡内递质的含量

EPSP

3. 2017N13 A 以下关于兴奋性突触后电位的叙述中，正确的是
   A.由突触前神经元释放抑制性递质而产生
   B.性质上属于动作电位，但幅度较小
   C.重复刺激可发生时间的总和
   D.是由突触后膜 $K^+$通道开放而产生
   虽然有K+外流,但关键是Na+内流




4. 2017N140 X 影响突触前神经末梢释放神经递质的数量的主要因素为
   A.进入神经末梢的 $Ca^{2+}$量
   B.动作电位的频率
   C.神经冲动的传导速度 欲速则不达
   D.突触囊泡的大小 与释放递质有关,与释放数量无关

5. 2018N13 A 能阻碍突触前末梢释放递质而影响突触传递的物质是
   A.肉毒梭菌毒素 蜘蛛着位伤了肉
   B.有机磷酸酯 影响清楚递质清除
   C.α-银环蛇毒 影响受体

答案：1-5 C C C AB A