随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.副交感神经与交感神经的共性

交感N:扩瞳(虹膜辐射肌α1受体)
副交感N:缩瞳(瞳孔括约肌M受体)
] 收缩,但肌肉不同

均使唾液↑	交感神经NA→唾液腺α_1-R→少量粘稠唾液↑ 副交感神经ACh→唾液腺M-R→大量稀薄唾液↑
可有紧张性 在与血管有关的神经纤维中,只有交感缩血管纤维有紧张性	如心交感神经和心迷走神经平时都有紧张性 需注意：骨骼肌血管的交感舒血管纤维、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管的副交感舒血管纤维没有紧张性
活动度大小 与效应器功能状态相关	交感神经：抑制未孕子宫平滑肌（β_2-R）、而兴奋有孕子宫平滑肌（α_1-R） 副交感神经：胃幽门处于收缩状态时刺激迷走神经使之舒张、而幽门处于舒张状态时刺激迷走神经使之收缩

真题解析·递质和受体

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N20 A 交感神经系统兴奋时，引起的生理效应
A.胃肠运动增强
B.支气管平滑肌收缩
C.瞳孔开大肌收缩
D.促进胰岛素的分泌 血糖↑

神经→递质→受体→效应

2. 2014N156 X 交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
A.其功能活动较为广泛 节后纤维长
B.对消化系统活动具有增强作用 抑制
C.动员机体潜力以应对环境急剧变化 应急
D.对骨骼肌舒血管活动有紧张性作用 只有交感缩血管有紧张性

3. 2015N156 X 副交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
A.其功能活动相对局限 汗毛肾肾多数血只受交感支配
B.对消化系统活动具有抑制作用
C.活动度大小与效应器功能状态有关 休养生息,储备能量 与交感对比(注意小细节)
D.有利于机体的休整恢复和能量蓄积
如果把"与交感神经相比"加入题干则C不能选,因为C是共性

4. 2016N20 A 在周围神经系统中属于胆碱能纤维的是
A.所有副交感节后纤维
B.所有自主神经节前纤维
C.所有支配血管的交感节后纤维
D.所有支配汗腺的交感节后纤维 温热性发汗是交感胆碱能,精神性发汗是交感肾上腺素能

副交感神经 ┌ NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
└ GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

5. 2019N13 A 副交感神经兴奋可引起的生理反应是
A.糖原分解
B.汗腺分泌
C.瞳孔散大

交感N:血糖↑ 汗腺↑ 扩瞳 胰岛素↓
副交感N:血糖↓ ✗ 缩痛 胰岛素↑

答案:1-5 C AC ACD B D