④去大脑僵直的类型

γ僵直（主要γ运动神经元兴奋性比α高） 去大脑僵直主要是γ神经元放电过强的牵张反射	α僵直
高位中枢通过下行传导束——网状脊髓束（网易） ↓ 提高脊髓γ运动神经元的活动 （易化区的冲动兴奋γ） ↓ 肌梭传入冲动增多、肌梭敏感性提高 ↓ 兴奋α运动神经元	高位中枢通过下行传导束—— 前庭脊髓束（阿欠） ↓ 兴奋α运动神经元 （易化区的冲动直接兴奋α）

网状脊髓束 → γ兴奋 → 梭内肌收缩↑↑ → 肌梭Ia↑↑↑ → 兴奋α→可以完成牵张反射

4.对比

①在中脑头端切断网状结构：猫进入持久昏睡状态

（脑干网状结构上行唤醒系统维持和改变大脑皮层兴奋状态）

②去皮层僵直：蝶鞍上囊肿→皮层与皮层下结构失去联系→下肢伸肌僵直、上肢半屈





图 10-24　人类去皮层僵直及去大脑僵直

A、B、C为去皮层僵直；A为仰卧、头部姿势正常时，上肢半屈；B和C为转动头部时的上肢姿势；D为去大脑僵直，上、下肢均僵直。



去皮层僵直与
去大脑僵直
不同的是——
去皮层僵直
保留了中脑红核
维持上肢半屈

去大脑僵直 把中脑红核切掉了

即去大脑僵直=
去皮层+去中脑红核