

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·肌紧张/肌张力

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

肌紧张/肌张力↓	肌紧张/肌张力↑
脊休克期间 懵了 ①脊髓**突然**失去高位中枢的控制 ②牵张反射↓、尿粪**潴留**等	**脊休克恢复**（部分脊髓**反射**） 牵张反射↑、尿粪**失禁**、**屈**肌反射↑、**伸**肌反射↓ 去抢圣剑 失去了大脑皮层对脊髓的抑制,由于大脑皮层抑制深反射,所以失去大脑皮层的抑制作用会表现牵张反射↑
肌紧张、腱反射  	**去大脑僵直** ①中脑上、下丘之间切断**脑干（预后不良）** ②脑干易化区明显占优势不平衡 ③主要是 γ 运动神经元放电**过强的牵张反射** ④**四肢伸直**呈角弓反张
	去皮层僵直 蝶鞍上囊肿，下肢伸直、上肢半屈
亨廷顿舞蹈病 ①**新纹状体 GABA** 能神经元病变→**易化**大脑皮层发动运动、对多巴胺能神经元的抑制减弱 ②治疗：**氟哌啶醇和氯丙嗪、丁苯那嗪和利血平** 我抚琴,你尬舞	**帕金森病（震颤麻痹）** ①**中脑黑质多巴胺**能神经元病变→**抑制**大脑皮层发动运动、对胆碱能神经元的抑制减弱 ②**静止性震颤**（丘脑外侧腹核异常） ③治疗：**左旋多巴、东莨菪碱或苯海索、5-羟色氨酸、高频电刺激丘脑底核**
脊髓小脑病变 肌张力及肌力↓、共济失调、**意向性震颤** 脊肌济意	
下运动神经元病变（软瘫） 牵张反射↓、明显肌萎缩	**上运动神经元病变（硬瘫）** 牵张反射↑、**Babinski 等病理征（异常的伸肌反射）**

真题解析·神经系统调控躯体运动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点


1. 2013N19 A 腱器官传入冲动增加所引起的效应是

A.对同一肌肉的 γ 运动神经元起抑制作用

B.对同一肌肉的 α 运动神经元起抑制作用

C.使梭外肌收缩增强

D.使梭内肌收缩增强



2. 2013N155 X 小脑功能异常可能出现的现象有

A.肌张力增高 只说小脑,要当成易化肌紧张的

B.意向性震颤

C.位置性眼震颤

D.站立不稳

	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓）（前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽） 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 凝视前方,头没有动,眼睛就开始动(眼震颤) ③位置性眼震颤 （头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱（四肢乏力） ②共济失调 ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍 （肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨，但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

答案:1-2 B BCD