随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、激素的分泌方式





图 11-1　激素在细胞间传递信息的主要方式

A. 远距分泌；B. 神经内分泌；C. 胞内分泌；D. 自分泌；E. 旁分泌。

①远距分泌/血运分泌

②**旁分泌**（经组织液在局部发挥体液调节）：如**胰岛激素** ai 小弟



规律：体液调节范围一般比较广

特殊：范围局限的体液调节(局部调节)如旁分泌

③自分泌

④内在/胞内分泌：儿茶酚胺释放入血

→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命 为了应急


⑤腔分泌：激素直接释放至胃肠腔中发挥作用，

e.g 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素

多见于胃肠激素（没有经过导管-不是外分泌）

VS外分泌：多见于胃液、胃酸、胃蛋白酶、胰酶等(经过导管)

⑥**神经内分泌**（神经激素入血啦）



不含腺细胞
不合成激素
只能储存激素

腺细胞❌

神经激素指由下丘脑神经细胞合成分泌的激素：

神经垂体分泌	下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成	**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT** 经轴突/垂体束至垂体后叶/神经垂体储存（轴浆运输）
下丘脑分泌	下丘脑小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**	促甲状腺激素释放激素 TRH（release） 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 促性腺激素释放激素 GnRH 生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST　VS生长激素GH是由腺垂体分泌 催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF　属于垂体激素 （旧版教材还有：促黑激素释放因子、促黑激素抑制因子）

下丘脑 → 催乳素释放因子 → 腺垂体 → 催乳素 → 泌乳　OT类似于

小凯笔记自行整理

	ADH、VP	OT
来源	主要为视上核分泌	主要为室旁核分泌
作用部位	肾集合管	乳腺、子宫
作用机制	增加肾集合管对水的通透性	使乳腺中的肌上皮收缩，促进子宫收缩
主要作用	水重吸收增加、尿量减少、血压升高	哺乳期促进乳汁排出、分娩时促进子宫收缩
调节途径	血浆渗透压↑、血容量↓、动脉压↓	射乳反射和分娩时女性生殖道扩张 阴道、子宫颈机械性刺激