ACTH在安静状态下不会使醛固酮释放:醛固酮来自球状带

②ACTH 主要促进**肾上腺皮质的束状带和网状带增生**：长期大剂量用 GC 通过**负反馈**致 CRH、ACTH↓→肾上腺皮质束状带和网状带萎缩。可在治疗中间断补充 ACTH，**不能突然停 GC**、否则一旦遇到严重应激情况（如感染、创伤、手术）可致肾上腺危象

外源性GC

此时内源性GC↓

生理:ACTH→GC↑


应激:ACTH→GC↑醛固酮↑(非自动控制系统,无负反馈)

2.应激水平（**非**自动控制系统）

糖皮质激素抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、抗免疫，是**应激最重要的激素**，应激能增强机体**耐受伤害性**刺激，因此切除双侧肾上腺后、动物因缺乏糖皮质激素很快死亡

三、糖皮质激素的其它作用举例

允许作用	增加肾上腺素能受体的数量和亲合力
嗜酸性粒和淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑（减少酸雨降临）	库欣综合征患者多血质外貌 红细胞多 GC 可治疗淋巴细胞性白血病
保钠、排水、排钾 排水>保水 ①较弱的醛固酮作用 乙醇 咖啡因 糖皮质激素 尿钠肽→ADH↓ ②入球动脉阻力↓（GFR↑）+**ADH↓**（重吸收水↓）	GC 减少可致水中毒 急性淋巴细胞白血病治疗:VP DVP DVLP(P指的是泼尼松)
胃酸和胃蛋白酶原↑	可致应激性溃疡
维持神经系统兴奋性	可诱发加重癫痫
肺泡表面活性物质↑	GC 可治疗新生儿呼吸窘迫综合征
肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收	库欣综合征患者**骨质疏松** 骨头的钙被溶解吸收了



原醛和库欣综合征最早表现都是高血压

促进脂类、蛋白质分解

GC可维持神经系统兴奋性

排水>保水

应激性溃疡出血(上消化道出血)