随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）卵巢月经黄体

（孕激素为主）

（三）卵巢妊娠黄体（妊娠早期）和胎盘（妊娠 10 周后）

（ttsx 卵子受精开启新时代）

①滋养层细胞分泌**人绒毛膜促性腺激素 hCG**，检测 **hCG 诊断早期妊娠**

②**hCG** 使月经黄体变为妊娠黄体，并**维持妊娠黄体分泌雌、孕激素**

刚才是月经黄体变为白体-雌孕激素撤退


（没有雌孕激素撤退——停经）

③hCG 在妊娠 **8-10 周达高峰**，妊娠黄体寿命约 10 周，**妊娠 10 周后由胎盘接替妊娠黄体分泌雌、孕激素**（接盘侠）

④**胎盘**分泌的雌激素主要是**雌三醇 E_3**、且为**胎盘+胎儿**共同合成（一家三口），检查 **E_3 判断胎儿是否在子宫内存活**

⑤胎盘分泌的**孕**激素维持妊娠期子宫处于**静息**状态

⑥**启动分娩**的决定因素是**孕激素撤退**（不是缩宫素）



相似作用小结：

库欣综合征
- 皮肤色素沉着：依赖ACTH的库欣综合征:腺垂体长肿瘤(ACTH↑→GC↑)
- 无皮肤色素沉着：不依赖ACTH的库欣综合征:肾上腺皮质长肿瘤产生GC↑→负反馈ACTH↓

缩胆囊素-促胃液素、促胰液素-血管活性肠肽、生长激素-催乳素、LH-hCG、ACTH-促黑激素（依赖 ACTH 的库欣综合征皮肤色素沉着）

腺垂体ACTH↑ → 肾上腺皮质GC↑；ACTH↓ 负反馈

ACTH↑→促黑激素

VIP、促胰液素 → 导管细胞 → HCO_3^-、水

缩胆囊素、迷走N、胃泌素 → 腺泡细胞 → 酶