随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

## （四）肾上腺和脂肪组织等

**肾上腺皮质**网状带分泌的雄激素，在**脂肪**组织等经**芳香化酶**→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源（肥胖与乳腺癌有关）

串：乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬/三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦（阿姨）

## 真题解析·生殖

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N23 A 雌激素和孕激素作用的共同点是
   A.促进乳腺导管增生、延长 部位不同
   B.使子宫内膜变厚
   C.使子宫输卵管平滑肌活动减弱
   D.减少宫颈黏液的分泌

雌激素让子宫内膜增生变厚
孕激素促进蜕膜化(间质细胞发生蜕膜化,体积变大),加之螺旋动脉生长,同时促进腺体分泌(分泌物潴留在腺体内)从而导致内膜变厚

2. 2013N24 A 灭活睾酮的器官是
   A.肾脏
   B.肝脏
   C.肺脏
   D.靶组织细胞

3. 2014N24 A 女性月经周期中出现两次分泌高峰的激素是
   A.卵泡刺激素
   B.黄体生成素
   C.雌激素
   D.孕激素

①优势卵泡成熟时(排卵前)
②月经黄体成熟时

促进输卵管黏液分泌;抑制宫颈黏液分泌(避免二次受孕)

4. 2015N24 A 孕激素对子宫的生理作用是
   A.促进子宫内膜增厚、分泌
   B.提高子宫平滑肌的兴奋性
   C.促进子宫颈分泌黏液
   D.提高子宫肌对缩宫素的敏感性

雌激素作用"兴奋的感觉"

5. 2016N24 A 在月经周期的卵泡期，唯有一个卵泡能最终发育成熟的主要原因是
   A.该卵泡分泌较多 $E_2$，使之摄取更多的 FSH 提高了对FSH的敏感性
   B.该卵泡分泌较多的 P，使之摄取更多的 LH
   C.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 FSH 分泌的作用较弱

答案:1-5 B B C A 无答案