（2）术前用药（别合成、别释放、别来刺激我心脏）负反馈导致TSH↑,TSH促进甲状腺肿大充血

①**原发性甲亢：先用抗甲状腺药、后加用碘剂 2 周**（抗甲状腺药把甲状腺搞大了、通过碘剂给它擦屁股）

②**继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药** 直接拮抗TSH

非弥漫性病变,不容易把甲状腺搞大,不用给碘剂擦屁股

碘剂	复方碘化钾 （卢戈 Lugol 液）	主要抑制甲状腺素释放 使甲状腺**缩小变硬**、充血**减轻**（直接拮抗 TSH）
抗甲状腺药	MMI、PTU	抑制 TPO→甲状腺激素合成↓→甲状腺**增大充血**
β-R 阻断剂	普萘洛尔	适合没有条件服用碘剂、抗甲状腺药或合并心动过速者 需注意 β-R 阻断剂的禁忌症 2234都积极笑变异咯

二、甲状腺癌

（一）类型

1.**乳头状癌最常见**（成人 60%、儿童 100%）小时候 100 分、长大 60 分就是幸福

①局部淋巴结转移较早、但**预后最好**（**局部**淋巴结转移与预后**无关**）

②多中心病灶，乳头中心**砂粒体**/钙化小体、**毛玻璃样核**、**核沟**（多个乳头脱毛要杀菌）

一般:恶性肿瘤的DNA丰富
特殊:甲状腺乳头癌的细胞核染色质较少

2.**滤泡癌早期易血道转移**

异型性(与正常组织做比较)小

注意：分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材、观察是否有包膜**侵犯**和血管侵犯（浸润）、即依靠**生物学行为**鉴别

最早最常见为血道转移:甲状腺滤泡癌、绒癌、HCC、肺的腺癌

抓规律记特殊:良性肿瘤有包膜,恶性肿瘤没有包膜,甲状腺滤泡癌有包膜

3.**髓样癌来源于滤泡旁/C 细胞（APUD）**小大类水一个

①**淀粉**样变性（水一点）小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌、甲状腺髓样癌、胰岛细胞瘤、嗜铬细胞瘤

②分泌**降钙素**致**低钙血症**；分泌 **5-HT** 等致类癌综合征（面部潮红、腹泻、多汗）比较活跃的表现

Hello有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核

4.**未分化癌预后最差（间变）**

①小、梭形、巨、混合细胞型（小说剧情混乱）

②早期易局部和远处转移

（二）检查和分期

①超声 表浅器官如甲状腺、乳腺、肝脏、胆道

②确诊：细针穿刺细胞学检查

③怀疑骨转移：ECT 中线结构易通过椎旁静脉系统发生骨转移(如甲状腺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌)甲乳省钱

放射性核素骨扫描-有地方亮起来(代谢活跃),怀疑出现骨转移

敏感性高、特异性低(炎症代谢也活跃,也可亮起来)

＜55 岁的分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）：

高分化　中分化

①任何 TNM_0 为I期

②任何 TNM_1 为II期

一位55岁以下的乳头癌出现了骨转移,TNM分期?
2期

（三）治疗

1.未分化癌：外放疗 VS 内放疗:131I

2.髓样癌：双侧全切、或患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切

