结扎甲状腺上动脉要**紧贴上极**以避免损伤喉上神经；结扎甲状腺下动脉要**远离下极**和保护腺体背面以避免损伤喉返神经（拍马屁留后路）


（4）甲状旁腺功能减退


①**低钙血症**（离子化钙影响神经肌肉兴奋性）：**针刺麻木**、**痉挛抽搐**、腱反射亢进、Chvostek/面神经征、Trousseau 征（CT 征）、呼吸困难

②**查血钙血磷**

③**补充钙剂**，可加服**骨化三醇**；保护腺体背面；若误切应移植至胸锁乳突肌

甲状腺 ┬ 滤泡上皮细胞→甲状腺素
　　└ 滤泡旁细胞→降钙素(CT)
甲状旁腺→PTH





九、甲状旁腺功能亢进

（1）单发腺瘤最多见

（2）检查　PTH升钙降磷

①发现甲旁亢的首要指标：血钙（高血钙、高尿钙、低血磷）

②诊断甲旁亢最可靠的指标：PTH

③定位：**超声**最常用、**核素**最准确

（3）分型　家家苦绝经老人在外关节骨碎骨萎

I骨型（最多见）：骨痛、**骨质疏松**　PTH过高→破骨细胞活动↑

II肾型：肾结石

III混合型




图 25-6　颈部解剖分区

颈前区：1. 颌下颏下区　2. 颈前正中区

颈侧区：3. 胸锁乳突肌区　4. 肩胛舌骨肌斜方肌区　5. 锁骨上窝

十、颈部肿块

	颌下颏下区	颈前正中区	颈侧区	颈后区	锁骨上窝
单发		甲状腺疾病 甲状舌管囊肿	胸腺咽管囊肿 血管瘤、淋巴管瘤 颈动脉体瘤	纤维瘤 脂肪瘤	
多发	淋巴结炎		淋巴结炎 淋巴结结核 淋巴瘤 转移性肿瘤	淋巴结炎	淋巴结结核 转移性肿瘤 （占颈部恶性肿瘤的3/4）