甲状舌管囊肿：

①先天畸形，＜15 岁多见

②**颈前区中线**、舌骨下方的**圆形囊性**肿块、边界清楚、**随舌头上下移动**

③完整切除囊肿、并发的瘘管、部分舌骨 防止复发

专题串联·甲状腺相关疾病的可能可能最可能和用药

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	痛	迅速增大	单侧或双侧不对称肿大	双侧弥漫肿大 亢/减/非	天天师兄提示 原发性甲亢	治疗
Graves 病				√	甲状腺肿大与甲亢**同时**出现 多有**突眼** **TRAb 中的 TSAb**	内科先考虑 **MMI、PTU**；有手术指征则**手术**；放射 ^{131}I
单纯性甲状腺肿				√	后期少数可变为结甲	甲状腺素 有手术指征则手术
结甲	**囊变伴出血**	**囊变伴出血**	√		可胸骨后甲状腺肿、继发甲亢、恶变、退变等	有手术指征则手术
亚甲炎	√	√	√		**1-3 周前驱感染**；**分离现象（BMR/T_3/T_4↑、摄碘率↓）**	NSAIDs 或激素 抗炎止痛
桥本				√	**甲减**、**TPOAb** 慢性淋巴细胞性/自身免疫性 大量淋巴细胞浸润，淋巴滤泡的形成	甲状腺素
腺瘤	**囊变伴出血**	**囊变伴出血**	√		结节光滑，可继发甲亢 高功能腺瘤(热结节)	手术
腺癌		√	√		结节不平，常伴**颈淋巴结肿大**	手术等

①未分化癌:外放疗
②髓样癌:全切或近全切
③分化型甲状腺癌:一般全切或近全切，满足<1cm5个无做患侧腺叶全切+峡部

小结甲状腺相关疾病的用药：

（1）**Graves 病**：**内科**题目先考虑**甲巯咪唑/他巴唑 MMI（首选）**、**丙硫氧嘧啶 PTU（妊娠早期 1-3 月首选）**。若中性粒细胞＜**1.5**×10^9/L **停药**

比MMI起效更快、抑制T4向T3转化

（2）甲危：**PTU（首选）**、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用阿司匹林）别合成、别释放、别来刺激我心脏上吐下泻、高热、大汗、谵妄、昏迷

（3）甲亢术前用药

①**原发性甲亢：先用抗甲状腺药（使甲状腺增大充血）、后加用碘剂 2 周（使甲状腺缩小变硬、充血减轻）**

②**继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药**

③**β-R 阻断剂** 不能用抗甲状腺素药、碘剂、有心动过速的时候

（4）碘剂可用于原发性甲亢术前用药、甲危；禁用于普通甲亢

（5）可使用甲状腺素的情况

①**甲减**：**桥本**、甲状腺手术后（甲亢、甲状腺肿瘤等）、放射 ^{131}I 治疗后、亚甲炎未经治疗