
②**单纯性甲状腺肿**

③Graves 病使用**抗甲状腺药若引起甲减或甲状腺明显增大**

④**分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）术后防复发（抑制 TSH）**：高危终生至＜0.1，中危终生至 0.1-0.5，低危 5-10 年至 0.5-2 一五得五,二五一十

甲状腺高功能腺瘤



常考的甲状腺疾病切除范围：

天天师兄

甲亢	全切、近全切、次全切/大部切 **原发性甲亢首选全切、近全切**；高功能腺瘤首选患侧叶或部分切
甲状腺髓样癌、多数分化型甲状腺癌	**全切、近全切（患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切）**
分化型甲状腺癌**全满足**（**＜1** 和五个无）	**患侧叶全切+峡部**

真题解析·颈部疾病

次全切



习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N81 A 女性，55 岁。因结节性甲状腺肿行双侧甲状腺次全切除术，术后病理报告，右叶甲状腺有 5mm 乳头状癌结节。该患者进一步的处理是

A.切除右叶甲状腺加颈淋巴结清扫 淋巴结清扫:不管阳性还是阴性同侧中央区/VI组/气管旁淋巴结都清扫

B.手术切除剩余的右叶甲状腺

C.终生口服甲状腺素钠

D.加用外照射治疗 未分化癌

切除范围	指征
双侧**全切** 或**患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切** （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 （全部满足）	肿瘤＜1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1 和五个无）

2. 2014N82 A 女性，29 岁。因右侧甲状腺结节行手术治疗，术中见甲状腺右叶直径 1.5cm 囊实性结节，未触及肿大淋巴结，冰冻切片提示甲状腺乳头状癌。该患者应采取的手术方式是

A.甲状腺近全切除术

B.甲状腺全切及颈淋巴结清扫术 右侧中央区淋巴结清扫

C.右侧腺叶切除术

D.右侧腺叶加峡部切除术

3. 2015N116-117 A 女性，37 岁。因左叶甲状腺乳头状癌行甲状腺左叶全切、峡部及右叶大部切除术。术后第 1 天发生呼吸急促，口周麻木，手足持续性痉挛。



116.为明确诊断，应首选的检查是

A.血 T_3、T_4

B.颈部 B 超

C.颈部穿刺

D.血清钙、磷浓度

117.首要的处理措施是

A.静脉注射钙剂

B.气管切开

C.拆除颈部伤口缝线

D.检查引流管

答案:1-3 A/C B DA