4. 2016N81 A 女性，29 岁，因右侧甲状腺结节手术，术中见甲状腺右叶多个囊实性结节，颈部无肿大淋巴结，行右叶全切除术。术后病理报告提示甲状腺内有 5mm 乳头状癌灶。对该患者进一步的处理方案是
A.口服甲状腺素 预防甲减,抑制TSH防止复发
B.峡部及左叶部分切除术
C.甲状腺近全切除术
D.甲状腺全切及颈淋巴结清扫术 分化型甲状腺癌的中央区淋巴结需要清扫
侧方淋巴结-阴性不清扫,阳性需要清扫

5. 2017N59 A 男性，45 岁。因甲状腺癌行左叶甲状腺全切术，术后出现饮水呛咳，但发音正常。首先考虑的原因是
A.喉返神经损伤
B.交感神经损伤
C.喉上神经外支损伤 说话向外面
D.喉上神经内支损伤 喝水向里面

6. 2017N132-133 B
A.普萘洛尔
B.复方碘溶液
C.丙硫氧嘧啶
D.醋酸泼尼松
能使甲亢患者甲状腺体积缩小，质地变硬的药物为
能使甲亢患者甲状腺体积增大，充血的药物为

7. 2018N64 A 女性，35 岁，甲状腺乳头状癌根除术后 1 天，发现饮水时呛咳，说话音调低。最可能的原因
A.声带损伤
B.喉上神经损伤
C.喉返神经损伤
D.插管所致声门水肿

结甲继发甲亢
8. 2018N93-95 A 女性，40 岁，患有甲状腺结节 10 年，近年来易出汗，心悸，渐感呼吸困难。查体：脉搏 104 次/分，BP 130/70mmHg，无突眼，甲状腺III度肿大，结节状。心电图示：窦性心律不齐。
93.最可能的诊断是 突眼主要见于Graves病,原发甲亢
A.原发性甲亢
B.单纯性甲状腺肿
C.继发性甲亢
D.桥本甲状腺炎
94.为明确诊断，主要的依据是 明确诊断的是结甲还是继发甲亢
明确现在的情况
A.颈部 CT
B.血清 $T_3$、$T_4$、TSH 值
C.甲状腺 B 超
D.颈部 MRI
95.该患者首选的治疗措施是 我高中姐凶呀
A.抗甲状腺药物治疗
B.甲状腺大部切除术

以题带动 知识点复习

手术
- 甲亢
  - Graves病:全切/近全切
  - 高功能腺瘤:患侧+峡部、部分切
  - 结甲继发甲亢:看情况
- 甲癌
  - ①未分化癌:外放疗
  - ②髓样癌:全切或近全切
  - ③分化型甲状腺癌:一般全切或近全切,满足<1cm5个无做患侧腺叶全切+峡部
  - 同侧中央区淋巴结需要清扫
  - 侧方淋巴结-阴性不清扫,阳性需要清扫

答案:4-8 A D BC B CBB/C