（三）治疗

1.首选根治术：切肿块及其上下缘≥5-8cm 的组织（五八同城买食材），消化道重建最常用的食管替代物是胃

手术会损伤周围大血管、重要脏器，容易切不干净

2.颈段及胸上段（距门齿＜25cm）、或发生远处转移：首选放疗（放了尔我）




图 30-2　食管癌切除术后胃代食管术

（1）上、中段食管癌的食管切除范围　（2）胃代食管、颈部吻合术


二、贲门失弛缓症


①与精神因素等相关，多见于青年女性

②食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌 LES 不能松弛→间歇性吞咽困难，钡餐鸟嘴样狭窄

③治疗：食管下段贲门肌层切开 Heller 术。在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病







真题解析·食管疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

钡餐

1.2021N60 A 女性，32 岁。间断吞咽困难伴呕吐十年。上消化道造影提示食管明显扩张，蠕动减弱，食管末端呈“鸟嘴”样狭窄，狭窄部黏膜尚光滑。宜采取的手术方式是

A.食管下段、贲门部肌层切开术

B.食管下段+近端胃切除术

C.食管大部分切除，胃代食管术　治疗食管癌

D.腹腔镜胃底折叠术　治疗胃食管反流病(内科搞不定)