⑥有波动感→穿刺抽脓→还需**切开引流**：

通畅引流是外科治疗感染的基本
如脓胸必须做胸腔闭式引流

表浅脓肿	**放射状**切口 避免损伤乳管
乳晕下脓肿	沿乳晕边缘作**弧形**切口
深部或乳房后脓肿	沿乳房下缘作**弧形**切口
用手指轻轻分离脓肿分隔；脓腔较大可在最低部作对口引流	




图 26-5 乳房脓肿的不同部位



图 26-6 乳房脓肿的切口


图 23-5 乳房脓肿的切口


图 23-6 乳房脓肿对口引流

5.乳管内乳头状瘤 有很多脆弱血管

①**最易血性溢液**（若乳管阻塞呈棕褐色），常不能触及肿块

②**切除病变乳管**+常规病检（6-8%恶变率）

6.浆细胞乳腺炎（无菌性炎症）

①急性炎症表现：可有橘皮样变

②慢性炎症表现：可有边界不清的肿块、乳头凹陷、皮肤粘连
纤维化

小结乳头溢液：正常月经或早期妊娠-浆液无色，乳腺囊性增生病-多种颜色，感染-黄绿色脓性，乳管内乳头状瘤-血性（若乳管阻塞呈棕褐色），乳腺癌-血性

下列哪些疾病会出现乳头凹陷？
A乳腺癌
B paget病(乳头湿疹样乳腺癌)

小结乳头凹陷：乳头先天发育不良、浆细胞乳腺炎、乳腺癌、乳腺结核（天酱陷爱河）

真题解析·乳房疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N77 A 女性，38 岁，因双乳胀痛伴肿块数年而就诊。查体：双乳可扪及多个大小不等的结节，质韧，同侧腋窝淋巴结无明显肿大，挤压乳头时有乳白色液体溢出，细胞学检查未发现异常细胞。最可能的诊断是

A.乳腺癌 每个月总有那么几天乳房胀痛,有肿块,医生说这是乳腺增生病

B.乳房囊性增生症 溢液各种颜色都有

C.导管内乳头状瘤

D.乳腺结核

2. 2013N175 X 以下关于乳腺囊性增生病特点的叙述中，正确的有

A.乳腺疼痛和结节为突出表现

B.触诊可触及颗粒样肿块

C.一般不必药物治疗 对症治疗

D.易发生乳腺癌 与乳腺癌关系不清楚

③**定期复查**（是否恶变有争议）：若肿块无明显消退或可疑恶变→切除活检；若**中重度不典型增生、且对侧乳腺癌或乳腺癌家族史→单纯乳房切除术**

答案:1-2 B ABC