二、创伤性窒息

有可能让胸腔负压直接变成正压

①钝性暴力挤压胸部→瞬间声门紧闭→胸内压骤↑→上腔静脉血液逆流→上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血→针尖大小的瘀斑

②**对症处理**（多在 2-3 周后出血自行吸收消退）纸老虎

三、纵隔肿瘤

（前鸡胸胸后发神经）

单胚层畸胎瘤

①前纵隔：畸胎瘤和皮样囊肿、胸腺瘤（前上纵隔）、胸骨后甲状腺肿（前上纵隔）ttsx

②中纵隔：心包囊肿、支气管囊肿、淋巴瘤

③**后纵隔**：神经源性肿瘤如**神经鞘瘤（哑铃形）**

VS 原发复合征:上叶下部、下叶上部近胸膜处有原发灶，结核性淋巴管炎+肺门淋巴结肿大构成哑铃状阴影




图 31-1 纵隔临床解剖分区






图 31-2 纵隔肿瘤好发部位



以心包分为前后纵隔

以胸骨角(平对第4胸椎)的平面分为上下纵隔
下纵隔根据心包的界限又分成前纵隔、中纵隔、后纵隔



肺上沟瘤、甲状腺癌、甲状腺手术后、食管癌、纵隔肿瘤、臂丛N根部撕脱伤

病例题中看到这种类似肺癌的表现时，留意选项中是否有纵隔肿瘤

四、急诊开胸探查

进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性**膈肌**损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝、休克、**心脏压塞**、**严重气管内出血如严重穿透伤或火器伤**（金莲哥、休心气）