②探查顺序：**肝脾→胃→十二指肠 1 段、空回肠、大肠→盆腔→胃后壁、胰→十二指肠剩余段**

③救治顺序：完整探查后→**救重的**→救轻的

④**不要**分离黏连组织（以免感染扩散）；关腹前用**生理盐水**反复冲腹腔、放引流

用抗生素会造成粘连

腹膜受刺激后自我保护,渗出纤维素,限制感染扩散

VS急性乳腺炎:手指轻轻分离脓肿分隔便于引流

真题解析·腹部损伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N111-112 A 男性，35 岁，骑自行车与汽车相撞后 1 小时来诊，查体：P 110 次/分，BP 60/45mmHg，面色苍白，左上腹压痛，肌紧张，移动性浊音(+)。

早期休克

脾 肝 胰

111.该患者最可能的诊断是

A.肝破裂

B.脾破裂

C.小肠破裂

D.胰腺损伤

112.为明确诊断，首选的辅助检查是

A.腹部 X 线片

B.腹部增强 CT

C.腹部 B 超

D.腹部 MRI

2.2014N80 A 腹部闭合性损伤手术探查时发现横结肠系膜根部有较多气泡，应高度怀疑的创伤是

腹膜后 空腔

⇓

十二指肠2.3

A.空肠破裂

B.直肠破裂

C.十二指肠破裂

D.横结肠破裂

3.2017N93-94 A 女性，55 岁。上腹部被汽车撞伤 2 小时，剧烈腹痛，伴恶心呕吐，神志淡漠。查体：P 135 次/分，BP 75/45mmHg，全腹有压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音可疑阳性，肠鸣音减弱。

93.对该患者首选的诊断方法是 脾、肝

A.腹部 CT 检查

B.腹腔穿刺

C.腹腔动脉造影

D.立位腹平片

94.该患者最可能的诊断是

A.胃穿孔

B.小肠破裂

C.腹膜后血肿

D.肝脾破裂

以题带动
知识点复习

4.2017N161 X 以下有关脾破裂的处理措施中，正确的有

A.先纠正失血性休克再手术

B.轻度脾破裂可行脾修补