C.外伤性脾破裂可行自体血回输
D.儿童切脾后可行自体脾片移植

5.2018N63 A 男性，30 岁，上腹部钝器伤 3 小时来院，曾呕吐少量鲜血，上腹及腰部疼痛。查体：上腹压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱，腹部平片见右肾及腰大肌轮廓模糊。该患者最可能的诊断是
十二指肠2.3
A.脾脏破裂
B.十二指肠破裂
C.胃破裂
D.空肠破裂

6.2021N93-95 A 男性，30 岁。晨起跑步时突然昏倒 2 小时入院。1 周前因骑车摔倒撞击左下胸壁，曾卧床休息 3 天。查体：P 120 次/分，R 30 次/分，BP 80/60mmHg，神清，面色苍白，左下胸可见皮下瘀斑，全腹轻度压痛及肌紧张，移动性浊音(+)，肠鸣音消失。
脾脏
93.最可能的诊断是
A.脾破裂 延迟性
B.肝破裂
C.胰腺破裂
D.肠系膜撕裂
94.为明确诊断，急诊首选的检查是
A.腹腔动脉造影
B.腹部 X 线片
C.腹部 CT
D.腹部 MRI
95.若行手术，术中探查的顺序是
A.先探查胰腺，后探查肝脾
B.先探查胃肠，后探查肝脾
C.先探查肝脾，后探查胃肠及其他
D.先探查肠系膜血管，后探查其他

7.2022N95-96 A 男，25 岁。骑摩托车摔伤后 1 小时来诊。查体：BP 100/60mmHg，心率 100 次/分，全腹压痛，脐周明显肌紧张、反跳痛，肝浊音界缩小，移动性浊音可疑。
95.该患者最可能的诊断是
A.脾破裂
B.肝破裂
C.胰腺损伤
D.肠破裂
96.首先进行的检查是
A.血淀粉酶测定
B.腹部 MRI
C.腹部 B 超
D.腹腔穿刺