随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·肠梗阻

（性感认识：痛吐胀停）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、主要病因和治疗

肠梗阻严重程度与有无血运障碍有关

1.腹部手术、损伤或炎症史（e.g结核性腹膜炎）：粘连性肠梗阻（最常见）。粘连越广发生肠梗阻的几率越大、但不代表肠梗阻越严重。先保守治疗

2.新生儿：肠道先天性畸形。手术为主　肠梗阻
- 机械性肠梗阻:肠管不通畅 e.g粘连性肠梗阻
- 麻痹性肠梗阻:肠子麻痹 e.g低钾血症、腹腔内出血、腹水、腹膜炎
- 痉挛性肠梗阻:肠子发生痉挛 e.g 铅中毒、急性肠炎
- 绞窄性肠梗阻:肠子已经发生缺血坏死

（麻痹性、痉挛性）蠕动有问题

3.≤2岁多见：**肠套叠**

①腹痛、腹部肿块、果酱样血便（肠系膜血管也套进去出现血运障碍）

②钡灌肠（兼治疗作用：冲开）弹簧或杯口状（2岁弹杯子装的果酱）；＞2天手术为主（222儿）（钡剂渗入套入部之间）

天天师兄

4.儿童：蛔虫团（单纯不完全性梗阻）。先保守治疗（不容易发生绞窄）




图 39-1　各种类型的粘连性肠梗阻

(1)肠袢粘连成团　(2)腹壁粘着扭折　(3)系膜粘着扭折
(4)粘连系带　(5)粘连内疝　(6)粘连成角,扭转



图 39-2　回结肠套叠

