随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

三、手术并发症 感染猪猪粪血

①切口感染：最常见，应拆除缝线、通畅引流

②腹腔内出血：多在术后 1 天内（你搞的），血容量降低、轻度腹膜炎，腹腔穿刺抽出不凝血　阑尾是空腔脏器，出血少


③粘连性肠梗阻：痛、吐、胀、停。粘连性肠梗阻难以预防，其发生与纤维素的分解速度有关，与体位、引流等无关

④阑尾残株炎：阑尾残端＞1cm 所致，需再次手术

⑤粪瘘 ①阑尾的残端没有结扎好 ②腐蚀性的药物处理阑尾残端

胃大部切除术术后出血
- 1 天内→术中止血不确切
- 1 周内→吻合口粘膜坏死脱落
- 1 月内→吻合口感染腐蚀血管

四、特殊类型阑尾炎（老幼病孕）



体征不典型、病情重、发展快，须尽早手术

①老年人：感觉迟钝，腹痛等症状不明显（很能忍）

②新生儿：最易穿孔，腹痛等症状不明显（只会哭）阑尾壁很薄，容易发生穿孔

③小儿：腹痛等症状明显

④HIV 感染者：WBC 多不高

⑤妊娠：手术切口偏高，需加黄体酮，不放引流减少刺激子宫。临产期（37 周左右）可剖宫产+切阑尾　保胎

小结：一旦确诊急性阑尾炎应早期手术切阑尾，但阑尾周围脓肿除外——其及时放引流、3 个月后切阑尾

急性阑尾炎	切口	生理盐水冲腹腔	放引流	围术期抗生素
单纯性	麦氏点	不	不	用
化脓性	麦氏点	脓液少→不 脓液多→要	脓液少→不 脓液多→看情况	用
坏疽穿孔性	右下腹经腹直肌	要	看情况	用
妊娠期	偏高	看情况	不	用

真题解析·阑尾炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N145-146 B

A.中药治疗

B.抗生素治疗

C.保守治疗，无效再行手术

D.尽早手术 除阑尾周围脓肿

6 岁儿童患急性阑尾炎，治疗应选择

妊娠 36 周孕妇诊断为急性化脓性阑尾炎，治疗应选择

2.2014N91-92 A 女性，22 岁。无诱因突发右下腹部剧烈疼痛…突然破了/堵了，向腰骶及会阴部放射，伴头晕、恶心、出大汗、欲排大便感，未作任何处理来院急诊。阑尾是空腔脏器，出血少　低血容量兴奋交感N　盆腔积血刺激直肠

91.在询问病史中，对明确腹痛病因价值最大的是

A.转移性腹痛史

B.泌尿系结石史

C.婚姻月经史

D.不洁饮食史