随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

2.2014N79 A 男性，73 岁。因肠梗阻 4 天手术探查，术中发现直肠、乙状结肠交界部直径约 3cm 肿瘤，尚可活动，近端结肠扩张、水肿。宜采取的手术是

按直肠癌处理

A.横结肠造口术
B.Miles 手术
C.Dixon 手术
D.Hartmann 手术

3.2014N86 A 目前认为 Dixon 手术的远端切缘至肿瘤最短的距离应是

A.2cm
B.3cm
C.4cm
D.5cm

乳腺癌保乳切除术:切肿块及其周围1~2cm
胃癌:5cm
食管癌:5~8cm
结肠癌:10cm

4.2015N86 A 男性，64 岁。排便习惯改变、便血 2 个月，应首选的检查是

A.直肠指诊
B.直肠镜
C.钡灌肠
D.纤维结肠镜

5.2017N58 A 以下关于结肠癌患者血清 CEA 检测的临床意义的描述中，错误的是

A.术前 CEA 指标正常是缩小切除范围的依据 不是所有患者CEA都会增高
B.术后 CEA 未明显下降说明可能有肿瘤的残留
C.术后 CEA 持续升高提示肿瘤复发
D.CEA 的阳性率和结肠癌的分期有关


6.2017N62 A 以下关于结肠癌的叙述中，正确的是

A.胃肠道肿瘤中预后最好 恶性肿瘤
B.左侧结肠癌多表现为贫血
C.右侧结肠癌多表现为肠梗阻
D.早期以血道转移为主 早期以淋巴转移为主

7.2017N64 A 男性，62 岁，脓血便 3 个月，结肠镜检距肛门处 7cm 可见直肠肿瘤，直径约 2cm，活检示直肠癌，对该患者恰当的手术方案为

≥7

A.Hartmann 术
B.Miles 术
C.Dixon 术
D.York-Mason 术



8.2018N134-135 B

A.Park 术
B.Miles 术
C.Hartmann 术

答案：2-8 D A A A A C CB