
全是液体、没气 VS 腹股沟斜疝:肠内有气体液体

2.鞘膜腔积液（透光试验阳性、无气液咕咕声）

	摸到睾丸？	平卧消失？
睾丸鞘膜积液	×	×
精索鞘膜积液	√	×
交通性鞘膜积液	√	可缩小消失



真题解析·腹外疝

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点


1.2014N87 A 男性，75 岁。因腹股沟斜疝嵌顿 2 天急诊手术。术中见疝囊内有大团小肠，仍有活动，并有少量淡黄色渗出液，松解疝环，将小肠还纳腹腔并作疝修补术。术后第 2 天，患者自觉腹痛较前加重，体温 38.8℃，腹部压痛、反跳痛、肌紧张（腹膜刺激征），WBC 18×10^9/L，最可能的原因是

A.术中腹腔感染

B.术中损伤肠管

C.缺血性肠病发作

D.遗漏术中坏死肠袢



	斜疝	直疝	股疝
好发人群	儿童、青年男性	老年男性	中老年肥胖女性
包块与腹股沟韧带位置关系	上	上	下
疝外形	椭圆形、带蒂梨形	半球大	半球小
进入阴囊	√	多×	×
回纳疝块后压内口是否还会突出	不会	会	会
咳嗽冲击感	√	×	×
嵌顿几率	易	不易	最易
疝囊颈与腹壁下A位置关系	外	内	-
精索在疝囊的位置关系	后	前外	-

2. 2015N77 A 以下腹部切口中，切口疝发生率最高的是

A.经腹直肌切口 经腹直肌(除腹直肌外其他纤维均为横/斜向走形)纵行切口会切断很多横向纤维,形成薄弱区

B.旁正中切口

C.沿肋缘斜切口

D.麦氏切口

3.2015N85 A 男性，23 岁。右腹股沟可复性包块 2 年。查体：肿块还纳后，压迫内环口肿物不再复出，无压痛。术后最有可能的发现是

A.直疝三角部位腹壁薄弱

B.疝囊颈位于腹壁下动脉外侧

C.盲肠组成疝囊壁的一部分 滑疝(难复疝)

D.疝内容物常为大网膜 难复疝多见

4.2017N61 A 以下选项中，最易发生嵌顿的腹外疝是 不鸣则已,一鸣惊人

A.脐疝

B.股疝

C.腹股沟斜疝 其次容易嵌顿

D.腹股沟直疝 最不容易嵌顿

答案:1-4 D A B B