5. 2019N63 A 男性，65 岁，右腹股沟包块 3 年，卧位可消失，12 小时前突然不能还纳，并出现右下腹痛。查体：T 38℃，P 100 次/分，右侧腹股沟 4×3cm 肿块，触痛明显，右下腹有压痛、肌紧张。正确的治疗方法是

可复 >4h 嵌顿疝 腹膜炎←肠管坏死（说明已绞窄）

A.切除坏死肠管，高位结扎疝囊 结扎大一窄


B.急行疝修补术

C.切除坏死肠管后疝修补术

D.注射止痛剂后手法复位 没大事:肠管无绞窄(无腹膜刺激征)、嵌顿<4h、疝块和腹壁缺损大

6. 2022N100-102 A 男，60 岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊一部分由盲肠构成。

100.该患者的诊断是



A.Littre 疝

B.滑动疝

C.Richter 疝

D.逆行性嵌顿疝

101.处理疝囊过程中，最易误损伤的器官是

A.精索

B.膀胱

C.盲肠

D.股动脉

102.对该患者目前认为较合理的疝修补术式是


A.Bassini 法

B.Halsted 法

C.McVay 法

D.Lichtenstein 法 RSL

7. 2023N63 A 关于腹股沟直疝的叙述，正确的是



A.疝内容物经腹壁下动脉外侧突出

B.多见于青年男性

C.压住深环站立时疝块出现

D.易发生嵌顿和绞窄

8. 2024N64 A 男性，65 岁。因右腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊的一部分由盲肠构成。应诊断为

A.肠管壁疝

B.滑动性疝

C.逆行性嵌顿疝

D.腹内疝

思维导图·腹外疝

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:5-8 A BCD C B