随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有


3.2019N60 A 脾切除、贲门周围血管离断术治疗肝硬化门静脉高压症食管静脉破裂出血的优点中，不被普遍认可的是

A.手术打击相对较小 做起来简单,未减少入肝血流

B.止血效果较满意

C.术后脑病发生率较低

D.术后肝功能改善 任何手术都会打击肝功能



4.2020N132-133 B

A.分流术

B.断流术

C.保守治疗

D.TIPS

男性，53 岁。乙肝肝硬化病史 13 年，中度至重度食管胃底静脉曲张，化验血 Hb 110g/L，WBC 2.3×10⁹/L，Plt 32×10⁹/L，肝功能 Child-Pugh A 级，无出血史。治疗方式应是 将来时,无红色征,无明显脾大脾亢

男性，48 岁，乙肝肝硬化病史 8 年，中度食管胃底静脉曲张，化验血 Hb 80g/L，WBC 3.1×10⁹/L，Plt 36×10⁹/L，肝功能 Child-Pugh C 级。近 1 年内曾呕血 3 次，等待肝移植。1 天前再次呕血 1500ml，行三腔二囊管压迫止血，24 小时放空气囊，仍有出血。应进一步采取的治疗方式是 进行时

保守治疗无效

5.2021N100-102 A 男性，40 岁。因呕血，黑便 2 天入院，既往乙型肝炎 10 年。查体：神志清，贫血貌，肝肋下未触及，脾肋下 3cm，腹部无压痛，移动性浊音(+)，肠鸣音活跃。化验：血 Hb 80g/L，血白蛋白 20g/L，血总胆红素 76μmol/L。黄疸

腹水

100.应首先考虑的诊断是 肝硬化

A.十二指肠溃疡

B.胃癌

C.门静脉高压症

D.胆管结石

101.为明确诊断首选的检查是

A.胃镜

B.上消化道造影

C.肠系膜上动脉造影

D.腹部 B 超

102.以下治疗措施中不恰当的是 进行时

A.扩容补液

B.手术治疗

C.内镜治疗

D.使用止血药

6.2022N132-133 B

A.肝前型

B.肝后型

C.窦前型

D.窦后型