外科学 肝胆胰脾疾病


核心精讲·胆系疾病

（性感认识：胆囊结石切胆囊、胆管结石取石头、AOSC 要减压）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

胆囊结石、胆囊炎、胆囊癌
胆管结石、胆管炎、胆管癌
胆管出血、胆管蛔虫、胆管闭锁、先天性胆管扩张





一、概述


（一）解剖

此处结石容易嵌顿

1.胆囊：包括底、体、颈、管。结石易嵌顿在颈部的囊状扩张（Hartmann 袋）

胆总管和胰管会共同开口于肝胰壶腹，结石一旦堵住了胆总管下端，胰管压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎

2.胆总管直径 0.6-0.8cm，分段：
①**十二指肠上段**（行胆总管切开的部位）
②十二指肠后段
③胰腺段
④十二指肠壁内段



胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌、胆管癌都可导致黄疸
胆囊肿大可排除：上段胆管癌（胆囊还会废用性萎缩）
胆囊肿大：胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌、中下段胆管癌
库瓦急埃courvoisier征（深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊）

（二）生理

1.胆汁分泌每天约 **800-1200**ml，来自于肝细胞、肝内胆管上皮细胞。胆囊接纳胆汁 500ml/d

2.促进胆汁分泌的因素
①回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）
②食物：刺激强度蛋白质＞脂肪＞糖（胆汁）
③激素：**促胰液素**（促进胆汁分泌最强）、缩胆囊素（促进胆囊收缩最强）、胃泌素
④迷走神经

促进Oddis括约肌舒张
不含与消化有关的酶
与CCK作用相似

胆固醇-溶质
胆盐、卵磷脂-溶剂
胆盐：卵磷脂=(2-3):1时胆固醇溶解度最大，因此胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑可引起胆固醇析出形成结石

（三）胆系结石的分类

胆固醇类结石（胆囊结石最常见类型）		胆色素结石（与溶血有关（肝硬化、溶血性贫血、心脏瓣膜置换术后）；与感染有关）		其它（泥路结石（结晶多见））
纯胆固醇结石（胆固醇＞90%）	混合性结石	黑色素结石（几乎在胆囊小黑屋）	棕色结石（多在胆管）胆感（胆色素钙结石）	碳酸钙、磷酸钙、棕榈酸钙等
剖面呈放射状	剖面呈放射状、层状	质地硬、杂质少	质地软、杂质多	
X 线常不显影	X 线常显影含钙盐	X 线部分显影		X 线常显影

溶在
含钙少
棕色结石常显影、黑色结石常不显影

注意：原发性肝外胆管结石多为棕色结石；继发性肝外胆管结石主要来自胆囊结石（多为胆固醇类结石或黑色素结石），少数来自肝内胆管结石