
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

十、胆管闭锁 肝内胆管闭锁相对来说比较少见

肝外胆管闭锁

1.分型（胆肝门）越来越往上走的感觉




I只涉及胆总管

II肝总管闭锁=肝胆管闭锁

III肝门部胆管闭锁（最常见）

肝左管肝右管汇合的地方出现闭锁

淤血、淤胆、淤虫、酒精肝脏可以肿大



2.出生后 1-2 个月出现持续性黄疸、肝肿大、发育不良

VS胆管癌:黄疸进行性加重

可发展为淤胆性的肝硬化

肝药酶诱导剂

苯巴比妥 →诱导→ 肝(酶)

3.苯巴比妥、激素治疗无效

胆管闭锁是梗阻性黄疸,不是溶血性黄疸 UCB →肝(酶)→ CB

VS新生儿黄疸(溶血性黄疸)产生大量UCB,苯巴比妥可诱导肝酶促进胆色素代谢UCB→CB

图 44-5 胆道闭锁


4.尽量出生 2 个月内手术 2个月后容易变为肝硬化

①尚有部分肝外胆管通畅、胆囊大小正常→肝外胆管或胆囊与空肠行 RY 吻合

Ⅰ Ⅰ Ⅰ型治疗

②肝门部胆管闭锁、但肝内仍有胆管腔→**Kasai 肝门-空肠 RY 吻合**（闭锁-开塞露-肛门-肝门）

③**肝移植**的适应症：Kasai 术后无效、肝内外胆管完全闭锁、已发生肝硬化



小凯笔记自行整理:

一般都是胆肠吻合

特殊:中段胆管癌→肝管空肠RY吻合

肝门部胆管闭锁、但肝内仍有胆管腔

→Kasai肝门-空肠RY吻合




图 44-6 胆道闭锁 Kasai 手术示意图

十一、先天性胆管扩张症（旧称先天性胆总管囊肿）

1.分型

I肝外胆管尤其胆总管囊性扩张、直径最大可达 25cm（最常见）

II胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样（2B 有包）VSLittre疝:嵌顿内容物为小肠憩室如Meckel憩室

III胆总管十二指肠壁内段呈囊状膨出（123）

IV肝内、外胆管扩张（死）

里-内

V/Caroli 病：肝内胆管多发扩张、伴肝纤维化；肝外胆管无扩张（燃烧我的卡路里-内）

