先天性胆管扩张症	√且间歇性		钝/胀痛、光滑的囊性肿块	尽早完全切除扩张胆管+胆肠吻合等
胰头癌	√且出现晚、进行性	√且无痛（courvoisier 征）	CT 诊断和评估可切除性	Whipple 术
壶腹癌 容易坏死	√且波动性（有减退）	√且无痛（courvoisier 征）		Whipple 术
十二指肠癌	√且出现晚、慢、浅	√且无痛（courvoisier 征）		Whipple 术 下蛋1年喂一壶

英文小结：胆肠R-Y吻合+切胆囊
- 肝外胆管结石及其炎症，伴①胆总管远端炎症狭窄致梗阻无法解除、胆总管扩张 ②胆胰管汇合部异常、胰液直接流入胆管 ③胆管因病变部分切除、无法再吻合
- 某些肝内胆管结石
- 胆管癌
- 胆管闭锁（I.I.I型：Kasai肝门-空肠RY吻合）
- 先天性胆管扩张
- 胆管损伤
- 姑息性减黄（不能切除的胆管癌、胆囊癌、胰腺癌…）

AOSC 急性梗阻性化脓性胆管炎
LC 腹腔镜胆囊切除术
G:胆囊 PTGD 经皮经肝胆囊穿刺引流
PTCD 经皮经肝胆管穿刺引流（PTC 经皮经肝胆管穿刺造影）
治疗角度不考虑
MRCP 磁共振胰胆管成像（水成像） 影像学均首选B超，最佳是MRCP，CT在两种危急情况也可能成为最佳：①急性非结石性胆囊炎 ②AOSC
ERCP 经内镜逆行性胰胆管造影
治疗性 ERCP：内镜下 Oddi 括约肌切开 EST+取石+鼻胆管引流 ENBD
Whipple 术：胰头十二指肠切除术 术后①可致胆肠吻合口狭窄，引起胆管炎、肝脓肿 ②胰肠吻合口漏，腹腔引流液淀粉酶明显升高 ③胃肠吻合口漏、反流
courvoisier 征：深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊——中下段胆管癌、胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌
上段胆管癌：胆囊废用性萎缩

真题解析·胆系疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N86 A 以下胆囊疾病中，与胆囊癌发病无关的是
A.胆囊结石＞2cm
B.“瓷化”胆囊
C.胆囊腺瘤
D.胆囊胆固醇息肉 和炎性息肉都几乎不癌变

2.2013N116-117 A 女性，82 岁，上腹痛，尿黄 1 周，1 天来寒战、高热。有高血压、糖尿病病史，药物控制，半年前心肌梗死。查体：T 39.5℃，P 120 次/分，BP 96/82mmHg，神志淡漠，皮肤、巩膜黄染，右上腹部压痛，Hb 115g/L，WBC 22×10⁹/L。B 超提示肝内外胆管扩张，胆囊增大，胆总管远端显示不清。个论内不讨论休克指数
116.此病状最符合
A.Charcot 三联征
B.Reynolds 五联征
C.Whipple 三联征 胰岛素瘤
D.Grey-Turner 征 重症胰腺炎肋腹部出血斑
117.以下治疗方法中，不宜采取的是
A.ENBD
B.PTCD
C.急诊探查胆总管并引流

答案：1-2 D BD