
D.上消化道穿孔
114.以下治疗方法中，最有效的是
A.加大抗生素用量
B.ERCP 置管引流
C.腹腔镜探查
D.PTCD
115.引起该病症的根本原因最可能为
A.体质虚弱易感染
B.胆肠吻合口狭窄
C.肝门部胆管癌
D.术中输血感染肝炎

PG↓诱发胃溃疡穿孔
12.2016N116-117 A 女性，63 岁。半年来因下肢骨关节病疼痛服用布洛芬治疗。10 天来上腹不适，1 周前突发腹痛，经禁食、输液 4 天后好转，但仍觉上腹胀满，不能进食，发热。查体：T 37.8℃，P 96 次/分，BP 130/80mmHg，上腹饱满有压痛，轻度肌紧张，肠鸣音正常。B 超示胆囊 6.8×3.5cm，壁厚 3mm，胰腺显示不清，上腹肝下有一直径 10cm 含液性病变。实验室检查：WBC 14×10^9/L，中性粒细胞 84%，Hb 112g/L，血尿淀粉酶正常。
B超(首选)下胰腺显示不清无诊断价值(受肠道气体干扰),CT(最佳)
116.该患者最可能的诊断是
A.胆囊穿孔后包裹积液 不是急性胆囊炎
B.胃穿孔后包裹积液 顺着右结肠旁沟流下来,被肝周围负压吸引
C.胰腺假性囊肿 血淀粉酶正常不优先考虑胰腺炎
D.巨大肝囊肿 有点胀痛无其他感觉、液性病变不在肝内
117.当前最适宜的处理措施是
A.穿刺置管引流 减轻症状、穿刺液可送检
B.继续保守治疗 对应胰腺假性囊肿
C.胆囊切除术 对应胆囊穿孔后包裹积液
D.开腹探查 不要动不动就开腹
腹部损伤



13.2016N175 X 急性非结石性胆囊炎的特点有
A.好发于老年女性 老年男性
B.病情发展迅速
C.坏疽发生率高
D.长期肠外营养者易发生

AOSC
14.2017N63 A 男性，65 岁。反复上腹部不适、轻度黄疸 3 个月，腹痛，黄疸加重伴高热 2 天。入院查体：T 39.5℃，P 125 次/分，BP 75/50mmHg，右上腹压痛。腹部超声检查发现胆囊多发结石，胆总管直径 1.5cm，胰头显示不清。血 WBC 15×10^9/L，中性粒细胞 90%。该患者首选的治疗措施是
A.大剂量抗生素抗感染后择期手术
B.全胃肠外营养后择期手术
C.大量输液抗休克同时尽早手术 胆总管切开减压+T管引流
D.应用血管收缩剂至血压正常后及早手术

答案：12-14 BA BCD C