18.2019N62 A 女性，28 岁，体检发现胆囊多发结石，最大直径 0.6cm，无症状。应采取的处理措施是
A.胆囊切开取石术
B.胆囊切除术
C.服用药物排石
D.随访观察

19.2019N98-99 A 女性，55 岁。反复发作上腹痛并发热 8 年，近日再次发作。查体：T 39℃，P 112 次/分，BP 132/86mmHg，巩膜不黄，上腹压痛，轻度肌紧张，肝区叩痛。化验：Hb 132g/L，WBC 13.8×10^9/L，N 86%，ALT 86U/L，TBil 28.5μmol/L。MRCP 示：左侧肝内胆管局限性扩张，其内可见多发低信号影，右侧肝内胆管及肝外胆管未见扩张，胆囊不大，肝左叶体积缩小。
结石、肿瘤
98.该患者的诊断是
废用性萎缩、纤维化
A.左肝脓肿
B.左肝癌
C.左肝内胆管结石、胆管炎
D.胆囊炎

ttsx	结石	水
B 超（回声）	强回声	无回声（液性暗区）
CT（密度）	密度可高可低（与含钙量相关）	低密度
MRCP（信号）	低信号（充盈缺损）	高信号

99.对该患者最佳的治疗方案是
A.内镜下 Oddi 括约肌切开术
B.PTCD 治疗
C.急行胆囊切除术
D.保守治疗后左半肝切除术

20.2019N163 X 胆囊结石可能发生的并发症有
A.梗阻性黄疸
B.肠梗阻
C.胆囊癌
D.胰腺炎

21.2020N61 A 正常成人每日胆汁分泌量为
A.200-600ml
B.800-1200ml
C.1300-1700ml
D.1800-2200ml
500:胆囊每天接纳的胆汁
800-1200:肝脏每天分泌的胆汁
200-300:T管引流的胆汁

22.2020N62 A 女性，45 岁。B 超发现胆囊多发息肉样病变，最大直径为 0.6cm，无症状。对该患者的正确处理是
A.胆囊切除术
B.保留胆囊，息肉摘除术
C.观察，定期复查
D.熊去氧胆酸溶解息肉

不是所有患者都是儿童发病
23.2020N93-94 A 女性，43 岁。1 年来经常右上腹胀痛，有时出现黄疸、发热。外院发现胆总管扩张并有结石，行胆囊切除、胆总管探查术，取出结石一枚。术后 3 周经 T 管造影，结果显示：胆总管扩张，直径约 5cm，腔内未见明显结石，肝内胆管未见扩张，十二指肠显影正常，胰管显影。

答案：18-23 D CD ABCD B C CD