随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

未堵死可有血管杂音　已堵死无杂音

2.区别　本质-动脉粥样硬化

动脉硬化闭塞症	血栓闭塞性脉管炎/Buerger 病
累及**中大动**脉（可有血管杂音）当堵死时也无杂音	累及**中小动静**脉
＞45 岁男性多见	**青壮年男性多见**
高血脂、高血压、糖尿病、吸烟等	**吸烟**（爱吸烟的小伙子）
广泛狭窄、钙化 营养不良性	节段性，游走性浅静脉炎 患者皮肤上可以看见一些红线

VS克罗恩病节段鹅卵石

二、静脉性疾病

1.共性　回流障碍、淤血

①表现：肿胀、暗红、潮热、下肢浅静脉如**大隐静脉迂曲扩张**

②治疗：**抬高患肢**（动低静高）、弹力袜或绷带、抗板、抗凝、扩管等　促进回流




图 34-6　下肢浅静脉
（1）大隐静脉及其属支　（2）小隐静脉及其属支




图 34-7　下肢深静脉
1. 股总静脉　2. 股深静脉　3. 股浅静脉
4. 大隐静脉　5. 小隐静脉　6. 腘静脉
7. 胫前静脉　8. 胫腓干静脉　9. 胫后静脉
10. 腓静脉






图 34-8　小腿浅静脉和交通静脉
（1）大隐静脉及内踝交通静脉　（2）小隐静脉及外踝交通静脉



回流障碍

正常静脉瓣膜指向心脏保证血液不倒流　静脉倒流




2.持久站立、久坐、体力强度高等所致原发性/单纯性下肢静脉曲张

①机制：静脉瓣膜缺陷（静脉逆流）、静脉壁软薄、浅静脉压升高

②表现：早期浅静脉迂曲扩张，后期足靴区（小腿远侧 1/3）色素沉着 重力原因

③治疗：浅静脉结扎、曲张静脉剥脱、或向曲张静脉注射硬化剂

感性认识:搞浅静脉



浅静脉和深静脉之间有沟通，血液可以通过深静脉回流

3.下肢深静脉血栓形成（静脉回流障碍）

①机制：静脉损伤（胶原暴露）、血流缓慢（如长期制动）、血液高凝（如创伤/肿瘤）

②最严重：**肺栓塞**（没形成则动、形成后别动）长期制动血流缓慢易形成血栓，形成深V血栓后动血栓容易脱落

③治疗：**经导管直接溶栓**（VS 内科）内科看低危中危高危

静脉疾病形成血栓时间较长，血栓栓子与肉芽组织发生机化，与血管壁粘连，贸然取易损伤血管