随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

④类型：堵哪儿里哪儿里痛

| | |
|---|---|
| 周围型 | 局限在股静脉→大腿痛肿；局限在小腿深静脉→小腿痛肿、Homans 征 |
| 中央型 | 髂窝、股三角区痛、全下肢肿 整个下肢回流障碍 |
| 混合型 | 各处都痛+全下肢肿。股白肿（苍白、皮温升高），股青肿（青紫、动脉搏动消失、皮温下降） |

最严重　　压迫动脉不太严重　　压迫动脉严重





图 34-11　一个典型血栓形成的病理解剖





图 34-12　下肢深静脉血栓形成的类型
（1）周围型　（2）中央型　（3）混合型

## 三、检查

1.首选超声多普勒，金标准血管造影




图 34-2　右髂总动脉栓塞
对比剂在栓塞近端骤然中断。



图 34-10　下肢静脉逆行造影
深静脉瓣膜功能不全时，显示对比剂自瓣膜近端向远端反流。



竹节样改变

2.试验

| | | |
|---|---|---|
| Buerger<br>（体位性色泽改变试验） | ①动脉供血不足：主要是动脉硬化闭塞症、血栓闭塞性脉管炎<br>②静脉逆流或回流障碍 | B-闭塞 |
| Trendelenburg | 大隐静脉瓣膜功能不全 | 英文单词最长对应人体最长的浅静脉大隐静脉 |
| Pratt | 交通静脉瓣膜功能不全 | tt-交替 |
| Perthes | 深静脉阻塞如血栓（Perthes 阳性——禁止结扎、剥脱、或向曲张浅静脉注射硬化剂） | person<br>不能搞浅静脉，此时血液只能通过浅静脉回流 |
| Homans<br>（踝关节过度背伸试验 Huai） | 小腿深静脉血栓 | 男神的小腿 |

