二、泌外恶性肿瘤

（一）肾细胞癌/肾癌/肾腺癌


肾小管上皮C


恶性肿瘤内含丰富糖原(HE染色被洗掉)

①**透明细胞癌**多见，可有腹部肿块、**同侧精索静脉曲张且平卧不消失（肾静脉或下腔静脉癌栓）**

②治疗：肾部分切除术、根治性肾切除术等

右侧要引起重视,因为原发精索静脉曲张更易发生在左边(左侧精索静脉成直角注入左肾静脉),当右侧出现精索静脉曲张时,大概率静脉内有癌栓堵住








图 55-1 肾脏增强 CT

（1）右肾癌，原发肿瘤分期 T_{1b}。（2）左肾癌并下腔静脉癌栓，原发肿瘤分期 T_{3b}。


（二）上尿路癌（肾盂癌和输尿管癌）来自变移上皮/移行上皮

经过输尿管


①**移行细胞癌**多见，可有**条状血块**、膀胱镜**输尿管口喷血** 恶性肿瘤易出血

②治疗：**根治性切除肾+全长输尿管+输尿管开口部的膀胱壁**

移行上皮处易互相转移



上尿路癌



IVU CTU

（三）膀胱癌 看到血尿第一反应:膀胱癌

膀胱内容量大,血液凝固

①**移行细胞癌**多见，可有**凝血块**，**无**膀胱刺激症或晚期出现（肿瘤坏死或并发感染）


恶性肿瘤多为无痛

②分期和治疗：

非肌层浸润的膀胱移行细胞癌 Tis 原位癌/非浸润癌：没有突破基底膜、也没有突出粘膜表面扁平 T_a 非浸润乳头状癌：属于原位癌 突出黏膜表面,乳头状 T_1 侵犯固有层或粘膜下层(侵犯上皮下结缔组织) 膀胱三角没有粘膜下层	**经尿道膀胱肿瘤切除术 TURBT**（bladder） 卡介苗是最有效的膀胱内免疫治疗制剂
肌层浸润的膀胱移行细胞癌（T_2 肌层、T_3、T_4） 非移行细胞癌 鳞癌、腺癌、肉瘤	**根治性膀胱切除+尿流改道** 或化疗为主+姑息性手术

膀胱没有粘膜肌层







5年生存率 98%

图 55-5 膀胱癌局部浸润深度