

专题串联·尿失禁

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

持续性尿失禁 （真性尿失禁）	充溢性尿失禁 （假性尿失禁）	急迫性尿失禁	压力性尿失禁
完全失去控制排尿的能力，任何时间、体位下尿液均会持续不自主从尿道口流出	尿液不连续从尿道口不自主流出、呈滴沥样、夜间多见 装满了漏出来	严重的尿频、尿急而膀胱不受意识控制就开始排尿	平常控制排尿能力正常，但咳嗽、起立等腹内压增加时少量尿液不自主从尿道口流出
多见于外伤、手术、先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌损伤	多见于前列腺增生、肿瘤、尿道狭窄等下尿路慢性梗阻或神经系统疾病导致膀胱逼尿肌收缩无力 患者每次排尿时尿液都难以排尽、膀胱内残余尿逐渐增多、膀胱过度充盈导致膀胱内压超过尿道阻力	多见于膀胱炎、神经源性膀胱、重度膀胱出口梗阻引起的膀胱不稳定收缩	多见于多产妇、绝经后引起的阴道前壁支撑力下降和盆腔组织功能障碍或前列腺手术后引起的尿道外括约肌损伤
			

真题解析·泌外梗阻和外伤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N147-148 B

A.质硬粗糙、不规则、常呈桑椹样，棕褐色 小草常见,喝了伤心

B.易碎粗糙、不规则，灰白色、黄色或棕色 鹿角易掰碎

C.光滑、淡黄至黄棕色、蜡样外观 蜡黄瓜

D.X 线不被显示 尿光了不显影

泌尿系草酸钙结石的特点是

泌尿系胱氨酸结石的特点是 CD都可,C更好

2. 2013N176 X 前列腺增生可出现的并发症

A.癌变

B.肾功能衰竭

C.腹股沟疝

D.无痛性血尿 第一反应泌尿外科恶性肿瘤

3. 2014N85 A 尿道膜部损伤后血肿最常见的部位是

前骑球、后骨膜

A.会阴部

B.阴囊部

C.尿生殖膈以上

D.下腹壁

以题带动 知识点复习

答案:1-3 AC BCD C