4.2015N147-148 B

A.尿道球部　　前骑球、后骨膜

B.后尿道

C.腹膜内膀胱

D.腹膜外膀胱

会阴部骑跨伤后出现排尿困难，尿道滴血的泌尿损伤，其常见部位是

骨盆多处骨折后出现排尿困难的泌尿损伤，其常见部位是 尿道比膀胱损伤概率更大

5. 2021N163 X 男性急性尿潴留常见的原因有

A.尿路结石

B.尿路狭窄

C.前列腺炎很重的前列腺炎可以出现急性尿潴留

D.良性前列腺增生

6. 2022N163 X 肾挫伤后临床上可表现为

A.肉眼血尿或镜下血尿

B.无血尿 形成血块堵死了　血尿和病变程度不一定相关

C.腰部肿块 肾裂伤后才会有

D.会阴部放射痛 累及输尿管

7. 2023N60 A 关于良性前列腺增生手术指征的叙述，错误的是

A.反复尿潴留

B.反复泌尿系感染

C.血清 PSA 轻度升高　轻度升高原因很多,做了直肠指检PSA都可能轻度升高。PSA明显升高应该要做前列腺穿刺活检看是否是癌(局限在前列腺-根治性前列腺切除;突破前列腺-抗雄+去势治疗)

D.继发膀胱结石

8.2024N96-97 A 男性，75 岁。进行性排尿异常 5 年，表现为尿频、尿等待、排尿不能成线，常因尿液不自觉流出而湿内裤，直肠指诊示前列腺增大，中间沟变浅。

96.该患者目前存在的情况是　前列腺增生

A.真性尿失禁

B.急迫性尿失禁

C.压力性尿失禁

D.充溢性尿失禁

97.导致此种情况最可能的原因是

A.慢性前列腺炎

B.良性前列腺增生

C.前列腺癌

D.膀胱癌

9. 2025N60 A 常用于治疗前列腺增生症的联合用药方案是

A.α 受体拮抗剂+5α 还原酶抑制剂

B.β 受体拮抗剂+5α 还原酶抑制剂

答案:4-9 AB ABD AB C DB A