外科学 骨科疾病

考频（10 题，★★★）：A_1 3 A_2 5 B 0 X 2

①运动系统畸形
②运动系统损伤：骨折和脱位（四肢+躯干、概论）、膝关节损伤、慢性损伤（肩周炎等）
③颈腰椎退行性病
④骨与关节感染：化脓性、结核
⑤非化脓性关节炎：强直性脊柱炎、骨关节炎、~~类风湿关节炎~~
⑥骨肿瘤：骨软骨瘤、骨巨细胞瘤、骨肉瘤等

核心精讲·运动系统畸形

（性感认识：转变思路提高效率）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、先天性肌性斜颈

胸锁乳突肌

①一侧胸锁乳突肌挛缩→**头**偏向**患**侧、**下颌**转向**健**侧，患侧面部发育小
②<1 岁：按摩、热敷、手法矫正、矫形帽外固定 ttsx 一直被压着
③**胸锁乳突肌切断术的最佳年龄：1-4 岁**



1 岁后：
斜颈割脖：先天性肌性斜颈作胸锁乳突肌切断术的最佳年龄 1-4 岁
后催睾降蛋：隐睾治疗——1 岁后短期用 hCG 等
单纯疝囊高位结扎：>1 岁婴幼儿等 小脐没必要,结扎大一窄









二、发育性髋关节脱位

周围韧带、肌肉(鞋带)
股骨头(脚) 髋臼(鞋)
鞋子太大 鞋带太松

①**重要病因：原发性髋臼发育不良、关节韧带松弛症**
②病理变化：分为站立前期和脱位期（站立行走期）。其中站立前期的病变有：髋臼发育不良、浅而平坦，关节囊和韧带松弛，股骨头较小（脚太小）、圆韧带肥厚、股骨颈前倾角增大、股骨头可在髋臼内或脱位（鞋-鞋带-脚）
③女性多见，左侧多见 鞋没穿好 严重时:脚离开鞋子;不严重时:脚还在鞋子里
④站立前期：大腿内侧皮肤皱褶患侧加深增多，会阴部增宽，患侧下肢短缩，牵拉患侧下肢有弹响，**Ortolani 弹入试验和 Barlow 弹出试验**（**3 个月以上不**宜进行），髋关节**屈曲外展**试验，**Allis/Galeazzi** 征 一般脱位往后上方脱;特殊:肩关节往前面脱 3个月以上软骨就骨化了
⑤站立行走期：跛行、鸭行步态、**Trendelenburg 征/单足站立试验**、**股骨头上下移动似打气筒**
TT 欧巴外面去给三阿哥打气（T 像单足站立、TT 打气使你站立） 注意问的是站立前期还是站立行走期
⑥超声筛查：出生 3 个月后 X 线（shenton 线中断）3个月以前为软骨,软骨在X线上不显影

大隐V瓣膜功能不全:Trendelenburg试验
原发单纯的静脉曲张:一般见于持久站立的人群