

图 59-25 站立位脊柱全长正位 X 线片





真题解析·运动系统畸形

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N180 X 典型性先天性髋脱位的主要发病因素有（主要是鞋的问题）

A.髋臼发育不良（发育性髋关节脱位）

B.股骨颈前倾角增大

C.关节囊、韧带松驰

D.股骨头发育不良

若问主要的病理变化是什么
ABCD

2.2013N118-120 A 女性，13 岁。1 年前无意中发现双肩背部不等高，后逐渐明显。X 线显示胸椎侧凸畸形，Cobb 角 25°，临床诊断为特发性脊柱侧凸。

118.对该患者的最佳治疗方案是

A.改变坐姿

B.立即手术治疗

C.牵引按摩治疗，每月随诊一次

D.佩戴支具，每半年随诊一次

Cobb角:
>10度诊断,<20度观察随访
20度-40度支具(恐怖四肢两对)、>40度手术

119.其治疗目的是

A.找到病因，去除病因

B.尽早手术，矫正畸形

C.矫正畸形，获得稳定，维持平衡

D.维持目前状态，待骨骼成熟后再行手术治疗

120.以下关于该病的说法中，不正确的是

A.属于非结构性脊柱侧凸 神医说知无不言

B.最常见，约占脊柱侧凸 75%-80%

C.严重胸廓畸形可使肺受压变形，引起通气功能障碍 肺心病

D.可分为婴儿型、少儿型、青少年型及成人型

3.2013N180 X 以下先天性肌性斜颈的临床表现中，错误的有

A.头向健侧偏斜

B.下颌向健侧偏斜

答案:1-3 AC DCA AD