外科学 骨科疾病

核心精讲·运动系统慢性损伤 无菌性炎症

（性感认识：把握一般治疗原则）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、一般治疗原则

①临床观察、理疗 合用两种NSAID意义不大反而会加重不良反应

②NSAIDs：**单独用**、短期间断用，用选择性 COX-2 抑制剂塞来昔布、美洛昔康以减少胃黏膜损害

③糖皮质激素：不能多次用

④手术

天天师兄

二、粘连性肩关节囊炎

①女性多见、**左**侧多见，肩关节**外旋外展**（梳头发）、**内旋后伸**（挠后背痒痒）疼痛和受限

②软组织退变→**MRI** 诊断和鉴别诊断 看"软软的" 创伤性窒息也是自限性疾病

③6-24 个月可自愈，**每日做肩关节主动活动、不能三角巾悬吊固定**（区别于肩关节脱位）需要三角巾固定 不活动三角肌就会发生废用性萎缩

④无效可行**关节镜松解术**








软组织明显粘连导致肩关节活动受限




图 67-18 粘连性肩关节囊炎时的外展姿势实为躯干代偿侧弯




三、肱骨外上髁炎（网球肘）

①肘关节**外**侧痛、**Mills** 征（别动碗里的蜜汁肘子）击球动作牵拉前臂伸肌肌腱→长期反复牵拉导致无菌性炎症

②限制**腕**关节活动（wai wang wan）








图 67-16 肱骨外上髁炎压痛部位



图 67-17 前臂伸肌牵拉试验（Mills 征）

四、狭窄性腱鞘炎

主要是桡骨茎突的狭窄性腱鞘炎 局部水肿增厚的腱鞘

①**弹响指/扳机指**、痛性结节、**Finkelstein** 征（Finger sting）

②**限制活动→NSAIDs→注射激素**（至腱鞘邻近的**骨膜**）位置要注射准确

③无效可行**腱鞘切开减压术**