2.髋关节活动受限、腹股沟区深压痛、**4 字试验**



图 71-9 “4”字试验
(1)阴性 (2)阳性

4 字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎
（4 字是姑姑的盒子）

天天师兄

3.X 线分期（8 周）约-硬-头塌-头脱
I软骨下溶解期：新月征→**髓芯减压术**等
II股骨头修复期：硬化带
III股骨头塌陷期：头塌陷
如先天性髋关节脱位、股骨头缺血坏死
股骨头离开了髋臼就会出现Shenton线不连续
IV股骨头脱位期：Shenton 线不连续、关节间隙变窄、髋臼骨赘形成→全髋关节置换术
还见于发育性髋关节脱位　　继发性骨关节炎

半髋与全髋关节置换术的区别:换不换髋臼(全髋换)
原发性骨关节炎:关节本身没问题,可能是年龄大(关节退变),太胖了(关节承受不了)
继发性骨关节炎:关节自己有问题,可以是股骨头坏死/外伤/…导致髋关节有问题,继发的骨关节炎


4.早期诊断：**核素**（热区中有冷区）、**MRI**（双线征和新月征）核磁
缺血坏死区没有核素浓聚-冷区,有血供-热区










图 68-3 股骨头坏死的 MRI 表现

膝关节伸直时,两侧侧副韧带为紧张状态,关节稳定


三、膝关节韧带和半月板损伤


1.半月板损伤的要素：膝**半屈**（半-半）、内收或外展、重力挤压、旋转力量





2.红-红区指撕裂在滑膜缘有血运区，红-白区指撕裂在有无血运分界处，白-白区指完全无血运、多不能愈合





只有边缘有血供,越往里面血供越少,内部营养主要来源于滑液