3.两个概念

①半月板桶柄状撕裂：穿过半月板全层的纵行撕裂 ttsx 放纵吃饼

②多诺格 **Donoghue** 三联征：前交叉韧带断裂+内侧副韧带损伤+内侧半月板损伤（DD 前面是内内）






图 63-31 膝关节半月板损伤的类型
（1）纵行撕裂（桶柄状撕裂）（2）水平撕裂 （3）斜行撕裂 （4）放射状撕裂 （5）变异型撕裂（复合撕裂）

4.**试验**

①研磨/Apley、旋转挤压/McMurray（麦旋风）、过伸过屈、蹲走（广播体操）：**半月板**

②研磨/Apley、侧方应力：**侧副韧带**（扮演/play 伏地魔）

③Lachman、抽屉：**交叉韧带**（拉前幅度增加→前交叉韧带断裂、推后幅度增加→后交叉韧带断裂）拉抽屉

④轴移：前交叉韧带断裂后出现的膝关节不稳定（以前很轴）

5.首选 **MRI**（软软的），金标准关节镜


图 63-33 研磨试验（Apley 试验）



图 63-32 半月板旋转挤压试验（McMurray 试验）


图 63-34 蹲走试验


图 63-27 外翻应力试验（检查内侧副韧带）


图 63-28 前抽屉试验阳性

四、周围神经损伤

叩击实验

1.**Tinel 征：神经再生征**（太太再生）

周围神经损伤后，只要它所属的神经元及胞体还活着，即可再生，再生的神经感觉很敏感，因为髓鞘还不充分，所以当叩击时就会发痒





2.臂丛神经

①主要分支：

负责将肩胛骨拉向前方

胸长神经	损伤致前锯肌萎缩→**翼状肩** 没有被拉向前的肩胛骨向背面拱出
腋神经	损伤致三角肌萎缩→**方肩**（咦胸长的叶芳）肩关节脱位→方肩
肌皮神经、正中神经、尺神经、桡神经	鸡中翅呢 使肩膀圆隆

②行程：掌握解剖

根	由 C_5-T_1 神经根前支组成（五一）
干	C_5-C_6 组成上干，C_7 延续为中干，C_8-T_1 组成下干
股	各干分为前、后两股
束	上、中干的前股组成外侧束，下干的前股延续为内侧束，三干的后股组成后束
支	外侧束分出肌皮神经、正中神经外侧头 内侧束分出尺神经、正中神经内侧头 感性认识：尺神经损伤-偏内侧（小拇指侧）出现感觉、运动障碍 正中神经的内、外侧头汇合成正中神经 后束分出腋神经、桡神经 感性认识：桡神经损伤-后面背面出现感觉、运动障碍