3.其它神经损伤（咏神经损伤：中原迟早闹炊烟、金钩飞马夜方肩）

平面越高,支配范围越广,损伤出现的症状越多

	运动障碍	感觉障碍	备注
正中神经	大鱼际萎缩手掌平坦+1指对掌障碍（猿手大鱼际萎缩） 屈腕障碍、前臂旋前障碍、123指屈曲障碍 对掌障碍	掌面：桡2/3含大鱼际手、桡3.5个手指	仅腕部损伤：无123指屈曲障碍 ⟶ 说明此时损伤位置低,有一些表现就没有 “与桡神经对比、123立正、算命正好中了”
尺神经	45指爪形手、Froment征、夹纸试验 手指内收外展障碍、45指屈曲障碍	掌面：尺1/3手、尺1.5个手指 背面：尺1/2手、尺1/2手指	仅腕部损伤：无45指屈曲障碍 “剪刀不OK”
桡神经 后束发出	伸腕障碍（垂腕）、前臂旋后障碍 伸指障碍、1指外展障碍“意不意外你都背下来了”	背面：桡1/2含虎口手、桡1/2手指 “桡后背痒痒”	若仅桡骨头脱位致深支损伤：无伸腕障碍、无前臂旋后障碍、无感觉障碍 “浅支管感觉、深支管运动”　只表现为垂指伸指障碍//指外展障碍
股神经	膝关节伸直障碍管伸膝	大腿前方、小腿内侧	皮肤　肌肉
坐骨神经	膝关节屈曲障碍管屈膝	小腿后外侧、足部	胫N和腓总N本身是坐骨N的分支
胫神经	屈踝/屈趾障碍呈钩状足　“抬高”	小腿后侧、足底	跖屈=屈
腓总神经	外翻/伸踝/伸趾障碍呈马蹄内翻足，跨阈步态“鸣啡” 需要足背、小腿前肌肉收缩才能伸指伸踝	小腿前外侧、足背	背屈=背伸=伸


对比


前 腓总-两个字(前外)
股 内 小腿 外 内股后劲
后 坐骨-两个字(后外)
胫

xxx障碍 ←相反→ 呈现xxx样子


此处有桡神经沟　伸直性(常见于儿童)

桡神经损伤的原因：肱骨中下 1/3 骨折、肱骨髁上骨折、桡骨头脱位（肘部）等





在肘关节这个平面发生损伤,损伤最高点只能到手指








图 62-5　手部感觉神经的分布



尺神经损伤




桡神经损伤




正中神经损伤



爪形手



Froment征



夹纸实验