外科学 骨科疾病

核心精讲·骨与关节感染

（性感认识：对比记忆）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图


一、骨与关节化脓性感染


（一）急性血源性化脓性骨髓炎

1.**金葡菌**为主

2.**儿童多见**，好发于**膝关节上下干骺端（股骨下端/胫骨上端）**。大量菌栓停滞在长骨干骺端→迅速出现骨坏死→脓肿→脓肿扩散致骨膜下、软组织等，后期骨膜受刺激增生→反应性新生骨形成

儿童骨骺血流丰富、慢





儿童干骺端血液是这个样子，导致很多细菌容易在弯曲的地方大量停留

图 70-1　急性化脓性骨髓炎好发于儿童长骨干骺端示意图




图 70-2　急性化脓性骨髓炎病理变化过程

（1）正常　（2）局限性脓肿　（3）脓液穿入骨膜下形成骨膜下脓肿　（4）骨膜下脓肿逐渐增大，穿破骨膜流入软组织，并有死骨和包壳形成

3.急性起病、**寒战高热**、**血 WBC↑**，关节附近疼痛、尤其明显**深压痛（关键）**骨髓位置深

进针抽吸再进针抽吸

4.**早期诊断**：**MRI**（首选）、**脓肿分层穿刺**涂片发现脓细胞或细菌（最佳）（注意：X 线 2 周内阴性）

分层-防止把表浅脓肿或细菌带入骨髓内

5.治疗

全身治疗	**抗生素**：早期、足量、联合、全程，一种针对 G^+球菌、一种为广谱 VS抗结核药强调适量因为肝损伤明显 要持续用到症状和体征消失、血象正常、手术引流液清亮 抗生素在体温正常就停药❌
	支持治疗：少量多次输血或球蛋白以提高免疫力
局部治疗	**早期手术：钻孔灌洗、或开窗减压引流** VS脓胸一定要配合胸腔闭式引流
	患肢石膏或皮肤牵引制动 此时骨头比较脆弱，容易发生病理性骨折

通畅引流是外科处理感染的基本措施




图 70-4　胫骨近端干骺端钻孔引流术示意图




图 70-5　开窗减压引流术示意图