（二）急性化脓性关节炎

常化脓性骨髓炎蔓延形成

1.**金葡菌**为主

2.**儿童多见**，好发于**髋**关节＞膝关节 一般:骺板都是在囊外

特殊:儿童髋关节的骺板在关节囊内,脓液可以绕过骺板进入关节腔

3.急性起病、**寒战高热**、**血 WBC↑**，关节附近疼痛，**明显肿胀、或浮髌试验（膝关节）**

VS化脓性骨髓炎:深压痛　关节腔渗出液太多让髌骨飘起来




图 70-3　脓液进入关节腔导致化脓性关节炎示意图

4.早期诊断：**关节穿刺**——浆液性（清）、纤维蛋白性（混）、脓性（黄白）





图 70-8　膝关节化脓性关节炎病理变化过程示意图

（1）正常　（2）浆液性渗出　（3）关节软骨破坏　（4）关节骨性强直

髋关节的关节囊将骺板包在内,骨髓炎就容易蔓延到关节腔






图 70-9　膝关节穿刺示意图

膝关节关节囊在骺板的外面,骨髓炎就不容易通过骺板蔓延到关节腔内

5.治疗

①全身用抗生素和支持治疗，患肢石膏或皮肤牵引制动（固定关节于功能位）

②**关节腔注射抗生素、或置管持续灌洗（膝关节）**，若无效或已化脓应在**关节镜下手术**、术后持续冲洗彻底引流

化脓性骨髓炎、化脓性关节炎中的髋关节位置深不可用　位置表浅

（三）慢性化脓性骨髓炎

1.病程长，窦道排出死骨

2.手术治疗为主，术前 2 天开始全身用抗生素 贸然做手术容易导致感染扩散

病灶清除术： 摘除全部死骨，清理脓液 切除坏死、肉芽和瘢痕组织 切除窦道，凿去封闭髓腔的硬化骨	直到组织新鲜并有出血为止 急性发作、周围没有形成完整的包壳不可以做病灶清除术 注意：过早手术摘除大块死骨会造成长段骨缺损、易致病理性骨折，因此大块死骨需等**包壳充分形成后再手术** VS假性囊肿:6-8周后囊壁成熟再进行内引流
消灭无效腔/死腔	碟形/Orr 手术、肌瓣填塞、抗生素骨水泥填塞
冲洗引流	术后持续冲洗、彻底引流
病段切除	不重要部位如肋骨、腓骨、髂骨翼可整段切除
闭合伤口	一期缝合

VS急性阑尾炎形成阑尾周围脓肿时应用抗生素配合引流(穿刺/置管引流),3个月后再切阑尾

注意：**急性**发作期以**抗生素**为主、积脓时切开引流，**不做病灶清除术** 以免感染扩散






图 70-6　慢性骨髓炎病变示意图与 X 线表现





