


图 71-1　骨与关节结核临床病理发展示意图

（原）原发病灶　（一）单纯骨结核　（二）由骨结核引起的全关节结核　（三）单纯骨结核穿破皮肤形成窦道　（1）单纯滑膜结核　（2）由滑膜结核引起的全关节结核　（3）全关节结核穿破皮肤形成窦道

真题解析·骨与关节感染

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N179 X　骨关节结核的临床表现中，下列描述正确的有

A.浅表关节早期常有轻度肿胀、疼痛与压痛

B.深部关节或脊柱肿胀不明显

C.脓肿常局限病灶附近，一般无红、热

D.发病多隐匿、缓慢，常为多发病灶 单发病灶

2.2015N89 A　慢性骨髓炎的治疗，不适当的处理是

A.清除病灶、消灭死腔、伤口闭合

B.可将不重要部位的病骨整段切除

C.病程经久不愈，可考虑施行截肢术

D.急性发作时，抗生素治疗、清除病灶 急性发作不能做病灶清除术

3.2017N66 A　急性血源性骨髓炎的好发部位是

A.桡骨，尺骨

B.肱骨，肩胛骨

C.骨盆，脊椎

D.胫骨，股骨

髋髋恰恰骨软骨

4.2017N103-105 A　女性，28 岁。右髋关节疼痛伴肿物 3 个月，低热、咳嗽 1 个月。查体：右髋关节呈屈曲畸形，可触及一直经约 5cm 左右的肿物，屈伸活动受限，Thomas 征阳性，血沉 58mm/h。X 线示右髋关节间隙变窄，关节面有虫蚀样骨质破坏，右髋臼约 2cm 大小的空洞。

寒性脓肿

不能因为关节间隙变窄而排除化脓性关节炎
化脓性关节炎渗出很多浆液,把关节腔鼓起来、应该增宽
后期一旦把关节软骨破坏,也会有关节间隙的变窄

答案：1-4 ABC D D CDD