随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

注意：

原发性骨关节炎病变始于软骨

类风湿关节炎病变始于滑膜

强直性脊柱炎病变始于骶髂关节

血友病关节炎病变始于关节内出血 **凝血障碍性疾病都是深部出血** 机关枪 jiyiqi

股骨头坏死病变始于骨

真题解析·非化脓性关节炎

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N118-120 A 男性，18 岁。近一年反复腰部疼痛，活动受限。近两月来又出现双髋疼痛，轻度屈曲畸形，需拄拐行走。X 线检查显示：双侧骶髂关节面模糊，双侧股骨头表面毛糙，髋关节间隙变窄。

118.该患者最可能的诊断是

A.骨关节结核

B.强直性脊柱炎

C.类风湿关节炎

D.双侧股骨头缺血性坏死 GC地易建联

119.以下检查中，对该患者明确诊断帮助最大的是

A.ESR、RF、骶髂关节 CT

B.ESR、HLA-B_{27}、骶髂关节 CT

C.ESR、RF、双髋关节 MRI

D.ESR、HLA-B_{27}，双髋关节 MRI

120.患者所患疾病较少累及的部位是

A.脊柱

B.髋关节

C.膝关节

D.手关节

2.2014N180 X 引起继发性骨关节炎的常见原因有

A.先天性关节结构异常

B.后天性关节面不平整

C.体重超重者，下肢关节过于承重劳损

D.关节不稳定

以题带动
知识点复习

3.2015N149-150 B

A.脊柱结核

B.强直性脊柱炎

C.脊柱恶性肿瘤

D.退行性脊柱骨关节病

X 线示骨破坏和椎间隙狭窄，常见于

X 线示“竹节样”改变，常见于

答案：1-3 BBD ABD AB