

随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

儿童、青少年多见淋巴瘤:前体/淋巴母细胞淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤、Burkitt淋巴瘤

淋巴瘤	中老年多见，融冰征（冰柠檬）	化疗+放疗，手术为辅
脊索瘤 黑精索	颅底、骶尾椎，二便障碍（损伤马尾），虽为恶性但无骨膜反应 气泡样细胞核黏液基质（吾上下求索边泡妞-恶心）	手术
骨瘤	病灶隆起于颅骨骨面（骨肿瘤学得脑袋尖尖）  特殊	手术
骨样骨瘤	成骨性良性肿瘤，明显夜间痛且阿司匹林可缓解 下肢长骨的低密度小瘤巢和周围硬化反应骨  良性肿瘤常有表现	手术+NSAIDs （小样还痛啊） 一般良性肿瘤是无痛的
骨囊肿	儿童青少年多见的长骨干骺端：类圆形边界清楚  	①可观察、刮除+植骨 刮除容易破坏干骺端影响发育 ②＜14 岁：甲泼尼龙注入囊腔 （亚狮龙）
动脉瘤性骨囊肿	青少年多见的长骨干骺端：骨性间隔将囊腔分成蜂窝或泡沫状 特点 	①刮除+植骨，术前要充分估计可能大量出血 可能破坏骨头 ②发生在脊椎（手术困难）：可放疗，但儿童放疗有破坏骨骺和恶变风险
骨纤维发育不良/异常增殖症	磨砂玻璃样改变，累及股骨近段者似牧羊人手杖 ttsx 	刮除+植骨，畸形者可截骨矫形