VS 全层纵向撕裂:半月板桶柄状撕裂 放纵吃饼 三、胸腰椎骨折

Chance 骨折：经椎体、椎弓、棘突的**横**向撕裂性骨折（切水果连切-偶然）






图 64-7 Chance 骨折





四、骨盆骨折

（1）骨盆分离试验与挤压试验阳性、双下肢不等长、**会阴部瘀斑（耻骨和坐骨骨折的特征）**






图 65-8 骨盆挤压试验与分离试验



图 65-9 测量胸骨剑突至髂前上棘之间的距离

（2）**并发症** 所有骨折最容易发生失血性休克的骨折:骨盆骨折


①失血性休克：骨盆骨折失血量达 500-5000ml，**休克**是骨盆骨折早期最危险的并发症，因此骨盆骨折后首要的处理措施是**快速建立补液输血通道** 都有呼吸困难,通过吸氧有无好转鉴别ARDS

②腹膜后血肿、脂肪栓塞（多在 3 天内）、下肢深静脉血栓形成和血栓栓塞（长期卧床等）、ARDS（吸氧无好转）

③后尿道尤其**膜**部、膀胱、直肠、腰骶神经丛、坐骨神经等损伤 全身炎症反应综合征在肺部的表现

前骑球,后骨膜

注意：**不选脊髓损伤（成人 L_1 以下骨折不会损伤脊髓）**



五、脊髓损伤

1.脊髓震荡：最轻微、可恢复

不完全脊髓损伤	深(本体+精细触觉)	痛温觉	运动障碍	粗略触压
脊髓半切	同侧x	对侧x	同侧x	减退
前脊髓	无障碍	x	x 下>上肢	减退
后脊髓	x	无障碍	无障碍	几乎无障碍
中央管周围	恢复期无障碍 急性期x	x	x 上>下肢	减退

粗略触压觉有多条传导束,即使脊髓丘脑前束被破坏,但薄束楔束还可以传导,所以粗略触压觉一般没问题