2.2016N89 A 颈椎压缩性骨折合并脱位首选的治疗方法
A.颅骨牵引 复位后再做手术
B.切开复位
C.颌枕带牵引
D.手法复位，石膏固定

脱位要手术
有椎间盘突出先切椎间盘

3.2018N103-105 A 男性，29 岁，高处坠落 2 小时，诉胸背部疼痛，双下肢不能活动。
103.根据患者以上情况，应首先考虑
A.脊柱损伤合并骨盆骨折
B.脊柱损伤合并脊髓损伤
C.脊柱损伤合并双下肢骨折
D.胸部损伤合并骨盆骨折

脊髓损伤

104.对诊断最有价值的检查是
A.MRI 检查
B.脊髓造影
C.X 线检查
D.脑脊液穿刺检查
105.现场对该患者的正确搬运方法是
A.一人用一手抱颈，另一手抱脚放于担架上
B.一人抬头，另一人抬足放于木板上
C.两人架其上肢拉到担架上
D.两人将躯干保持平直状态成一体平移至木板上

4.2021N67 A 骨盆骨折最常见的并发症是
A.尿道损伤 男性尿道很长,最常见尿道损伤
B.膀胱损伤
C.肾脏损伤
D.直肠损伤

5.2022N66 A 以下不属于颈椎骨折合并高位截瘫并发症的是
A.呼吸道感染
B.泌尿道结石
C.心力衰竭 老驴拉货(心肌损伤/负荷重)
D.体温失调 高位截瘫后交感N出问题导致低血压,心脏负荷减轻

以题带动 知识点复习

6.2023N65 A 对于骨盆骨折合并尿道损伤及失血性休克患者，正确的处理顺序是
A.骨盆骨折-尿道损伤-休克
B.尿道损伤-休克-骨盆骨折
C.休克-骨盆骨折-尿道损伤
D.休克-尿道损伤-骨盆骨折

一定要先补液抗休克,因为骨盆骨折失血量太大
尿道损伤有争议,如果理解为导尿、膀胱造瘘处理尿道损伤,尿道损伤就放在前面
如果理解为修补尿道损伤,尿道损伤应该放在骨盆骨折后面

答案:2-6 无答案 BAD A C C/D